

# סיכום מד"ר

20 בינואר 2014

מתוך הסיכום של אוהד אברבנל.

## תוכן עניינים

2	.....	1	מד"ר לינאריות מסדר I
2	.....	1.1	מד"ר עם משתנים מופרדים:
2	.....	1.2	מד"ר הניתנת להפרדת משתנים
2	.....	1.3	מד"ר פתירות ע"י השוואת משתנים:
2	.....	1.4	מד"ר הומוגני מסדר 0:
2	.....	1.5	.....
3	.....	1.6	מד"ר לינאריות מסדר I:
3	.....	1.7	משוואת ברנולי:
3	.....	1.8	מד"ר מדויקות:
4	.....	1.9	גורם אינטגרציה (הפיכת מד"ר לא מדויקת למדויקת).
4	.....	1.10	.....
4	.....	1.11	הורדת סדר משתנה:
5	.....	1.12	משוואת ריקטי:
5	.....	1.13	משפט הקיום והיחידות עבור מערכת מד"ר מהצורה:
5	.....	1.14	מד"ר סתומות מסדר I:
6	.....	1.15	משוואת לגראנז':
7	.....	1.16	משוואת קלרו:
7	.....	2	מד"ר לינאריות מסדר גבוה הומוגניות
7	.....	2.1	וורונסקיאן:
7	.....	2.2	משפט ליוביל
7	.....	3	מד"ר לינאריות מסדר גבוה לא הומוגניות
8	.....	3.1	וריאציית הפרמטרים
8	.....	3.2	מד"ר לינארית הומוגנית\לא הומוגנית מסדר גבוה עם מקדמים קבועים
8	.....	3.2.1	הומוגני
8	.....	3.2.2	לא הומוגני: שיטה למציאת $y_p$
9	.....	3.2.3	כלל
9	.....	3.3	משוואת אוילר
9	.....	3.3.1	הומוגני
9	.....	3.3.2	מקרה לא הומוגני - כללים:
10	.....	4	סיווג נק' סינגולריות
10	.....	5	טור פרוביניוס
10	.....	5.1	הערה:
11	.....	6	משוואת בסל
11	.....	7	מערכות משוואות - לינאריות מסדר 1, הומוגניות, עם מקדמים קבועים
11	.....	8	מערכות מד"ר מסדר ראשון לינאריות עם מקדמים קבועים לא הומוגניות
12	.....	8.1	פתרון מערכת לינארית לא הומוגנית עם מקדמים קבועים באמצעות אקספוננט של מטריצה
12	.....	9	שיטות לפתרון מערכות:
12	.....	9.1	שיטת ההצבה
12	.....	9.2	שיטת החילוף
12	.....	10	פתרון מד"ר באמצעות התמרות לפלס\פורייה
13	.....	11	בעיות שפה

**1 מדור לינאריות מסדר I**

**1.1 מד"ר עם משתנים מופרדים:**

$$y' = f(x)g(y)$$

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + c$$

**1.2 מד"ר הניתנת להפרדת משתנים**

מד"ר מהצורה

$$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0$$

היא מד"ר הניתנת להפרדת משתנים.

אם  $N_1(y_0) = 0$  עבור  $y_0$  כלשהו, אזי  $y(x) = y_0$  הוא פתרון של המד"ר.  
 אם  $M_2(x_0) = 0$  עבור  $x_0$  כלשהו, אזי  $x(y) = x_0$  הוא פתרון של המד"ר (שימו לב שלפי ההגדרה המקורית זה לא פתרון שכן זו לא פונקציה הפיכה ולא ניתן לחלץ מכאן פתרון  $y(x)$ ). אולם, הצורה סימטרית בין  $x$  ו  $y$ , וניתן לכתוב ממנה משוואה עבור  $\frac{dx}{dy}$  ולהתייחס ל  $y$  כמשתנה הבלתי תלוי ול  $x$  כמשתנה התלוי). אם  $N_1(y) \cdot M_2(x) \neq 0$ , ניתן לחלק במכפלתם ולקבל

$$\frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy = 0$$

**1.3 מד"ר פתירות ע"י השוואת משתנים:**

$$y' = f(ax + by)$$

$$z = ax + by$$

$$\int \frac{dz}{bf(z)+a} = \int 1dx + c = x + c$$

$$y(x) = \frac{z(x)-ax}{b}$$

**1.4 מד"ר הומוגני מסדר 0:**

אם ניתן לכתוב את המד"ר  $y' = f(x, y)$  בצורה  $y' = g(\frac{y}{x})$  אז היא נקראת מד"ר הומוגנית.  
 מד"ר הומוגנית ניתנת לפתרון ע"י הצבה  $z(x) = \frac{y}{x}$  כלומר

$$y(x) = z(x) \cdot x$$

$$\int \frac{dz}{g(z) - z} = \int \frac{dx}{x} + c = \ln|x| + c = \ln(c_1x)$$

כאשר  $c_1$  נבחר כך  $c_1x$  חיובי. אחרי ביצוע האינטגרציה מקבלים את  $z(x)$  ומוצאים את  $y$  להיות  $y(x) = z(x) \cdot x$

**1.5**

$$y' = f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{ax+by+c}\right)$$

1. כאשר  $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a & b \end{vmatrix} \neq 0$  (כלומר הישרים נחתכים).

נשתמש בהחלפת משתנים  $x = p + \alpha$  ו  $y = q + \beta$

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} c_1 \\ c \end{pmatrix}$$

מתקיים  $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dq}{dp} = f\left(\frac{a_1p+b_1q}{ap+bq}\right) = f\left(\frac{a_1+b_1\frac{q}{p}}{a+b\frac{q}{p}}\right)$

נציב  $z = \frac{q}{p}$  כלומר  $q = zp$  לכן  $\frac{dq}{dp} = \frac{dz}{dp} \cdot p + z$

$$\int \frac{dz}{f\left(\frac{a_1+b_1z}{a+bz}\right) - z} = \int \frac{dp}{p} + c$$

נקבל  $z(p)$  כלשהי, ואז  $q = p \cdot z(p)$ , נציב ונקבל:

$$y - \beta = (x - \alpha) \cdot z(x - \alpha)$$

2. כאשר  $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a & b \end{vmatrix} = 0$   
 נבחר  $a_1 = \lambda a, b_1 = \lambda b$ .

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{ax + by + c}\right)$$

$$y' = f\left(\frac{\lambda ax + \lambda by + c_1}{ax + by + c}\right)$$

$$y' = f\left(\frac{(ax + by)\lambda + c_1}{(ax + by) + c}\right)$$

ואת זה אנו יודעים לפתור.

### 1.6 מד"ר לינאריות מסדר I:

$$y' + p(x) \cdot y = q(x)$$

$p, q$  פונק' של  $x$  בלבד.

1. אם  $q(x) = 0$  המד"ר נקראת הומוגנית:  
 $y = c \cdot e^{-\int p(x)dx}$

2. אחרת נסמן  $y = c(x) e^{-\int p(x)dx}$   
 $y = e^{-\int p(x)dx} \cdot \left[ c + \int q(x) e^{\int p(x)dx} dx \right]$

### 1.7 משוואת ברנולי:

$$y' + p(x) \cdot y = q(x) \cdot y^n$$

עבור  $n \neq 0, 1$   
 אם  $n > 0$  אז  $y(x) = 0$  הוא פתרון (פרטי או סינגולרי).  
 אם  $n < 0$  אז  $y(x) = 0$  לא פתרון.  
 כאשר  $y \neq 0$  (זהותית) המשוואה שקולה למשוואה:

$$\frac{y'}{y^n} + p(x) \cdot y^{1-n} = q(x)$$

נציב  $z = y^{1-n}$   
 $z' = (1-n)y^{-n} \cdot y' = \frac{(1-n)y'}{y^n}$   
 פיתוח סופי:

$$y(x) = \left\{ e^{-\int (1-n)p(x)dx} \cdot \left[ c + \int (1-n)q(x) e^{\int (1-n)p(x)dx} dx \right] \right\}^{\frac{1}{1-n}}$$

### 1.8 מדר מדויקות:

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

נניח קיימת  $u(x, y)$  המקיימת  $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$  ו  $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$  אזי המשוואה היא:

$$du = 0$$

לכן  $u$  קבועה.  
**התנאי:**

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

### 1.9 גורם אינטגרציה (הפיכת מד"ר לא מדויקת למדויקת)

נניח שיש לנו משוואה מהצורה:

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

נכפיל את שני הצדדים ב  $\mu(x, y)$ :

$$\mu(x, y) P(x, y) + \mu(x, y) Q(x, y) = 0$$

נרצה למצוא את  $\mu$  המתאימה כך שהמד"ר הוא תהיה מדויקת, כלומר מקיימת:

$$\frac{\partial}{\partial y} (\mu(x, y) P(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} (\mu(x, y) Q(x, y))$$

ישנם 2 מקרים שיודעים למצוא את  $\mu$ :

1. אם  $\frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{Q}$  תלוי ב  $x$  בלבד אז מתקיים  $\mu = \mu(x)$

$$\mu = e^{-\int \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{Q} dx}$$

2. אם הביטוי  $\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \cdot \frac{1}{P}$  תלוי ב  $y$  בלבד אז מתקיים  $\mu = \mu(y)$

$$\mu(y) = e^{\int \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \frac{1}{P} dy}$$

### 1.10

מד"ר מהצורה:  $y^{(n)} = f(x)$  נפתור ע"י אינטגרציה חוזרת:

$$y^{(n-1)} = \int f(x) dx + c_1$$

$$y^{(n-2)} = \int \left[ \int f(x) dx \right] dx + c_1 x + c_2$$

וכך הלאה עד  $y$ .

### 1.11 הורדת סדר משתנה:

בסוג זה יש 2 מקרים:

1.  $y$  לא מופיע במשוואה. משוואה מהצורה:

$$y'' = f(x, y')$$

מסמנים  $z = y'$

$$z' = f(x, z)$$

פותרים עבור  $z(x)$  ומציבים  $z(x) + c$

2. כאשר  $x$  לא מופיע. מד"ר מהצורה:

$$y'' = f(y, y')$$

נגדיר  $p = y'$

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p$$

נציב במשוואה:

$$\frac{dp}{dy} \cdot p = f(y, p)$$

זו משוואה מסדר ראשון, נפתור עבור  $p(y)$  ואז פותרים את המשוואה  $y' = p(y)$  ע"י:

$$\int \frac{dy}{p(y)} = \int dx = x + c$$

### 1.12 משוואות ריקטי:

$$y' + f(x)y^2 + g(x)y + h(x) = 0$$

$$y(x) = \frac{c \cdot a(x) + b(x)}{c \cdot A(x) + B(x)}$$

### 1.13 משפט הקיום והיחידות עבור מערכת מד"ר מהצורה:

$$\vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y})$$

תהי פונק' וקטורית רציפה ומקיימת תנאי ליפשיץ ב  $\vec{y}$  בתיבה

$$B = \{|x - x_0| \leq a, |y_k - y_{k_0}| \leq b, k = 1, \dots, n\}$$

אזי למערכת המד"ר  $\vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y})$  יש פתרון אחד ויחיד ברוח  $a'$  כאשר:

$$\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0$$

$$a' = \min\left(a, \frac{b_1}{M_1}, \dots, \frac{b_n}{M_n}\right)$$

כאשר

$$M_k = \max_{(x, y) \in B} |f_k(x, \vec{y})|$$

### 1.14 מד"ר סתומות מסדר I:

1. משוואה מסדר 1 ממעלה n:

$$(y')^n + p_1(x, y) \cdot (y')^{n-1} + \dots + p_{n-1}(x, y) y' + p_n(x, y) = 0$$

לעתים ניתן לחלץ n פתרונות של  $y'$ , כלומר לקבל:

$$(y' - f_1(x, y))(y' - f_2(x, y)) \cdot \dots \cdot (y' - f_n(x, y)) = 0$$

במקרה כזה יהיו n פתרונות שונים של המשוואות  $y' - f_i(x, y) = 0$

2. כאשר x לא מופיע:

$$F(y, y') = 0$$

נציב  $p = y' = \frac{dy}{dx}$

את y לעתים אפשר לבטא באמצעות p בעזרת המשוואה  $F(y, p) = 0$  אז נקבל  $y = \phi(p)$   
נקבל ע"י אינטגרציה בחלקים:

$$x = c + \int \frac{dy}{p} = c + \frac{y}{p} + \int \frac{y}{p^2} dp = c + \frac{\phi(p)}{p} + \int \frac{\phi(p) dp}{p^2}$$

קיבלנו ביטוי של x ושל y באמצעות p.

3. כאשר  $y$  לא מופיע:

$$F(x, y') = 0$$

נניח שאנחנו יכולים לחלץ את  $x$  כלומר  $x = \varphi(y')$  נציב  $y' = p$  ואז  $x = \varphi(p)$

$$y = c + p \cdot \varphi(p) - \int \varphi(p) dp$$

4. מופיעים  $x$  או  $y$  אבל סתומות ביחס ל  $x$  או  $y$ :

$$F(x, y') = 0 \text{ או } F(y, y') = 0$$

נגדיר שוב  $y' = p$

(א) נתחיל מהמקרה

$$F(y, p) = 0$$

נציב  $y = \varphi(t)$ .

$$F(\varphi(t), p) = 0$$

מכאן נוציא את  $p$ ,

$$p = \psi(t)$$

והפתרון:

$$x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + c$$

$$y = \varphi(t)$$

(ב) כנ"ל אם

$$F(x, y') = 0$$

נציב  $y' = p$ ,  $x = \varphi(t)$  אזי  $F(\varphi(t), p) = 0$  נקבל

$$p = \psi(t)$$

והפתרון הוא:

$$x = \varphi(t)$$

$$y = c + \int \psi(t) \varphi'(t) dt$$

### 1.15 משוואות לגראנז':

$$y = \varphi(y') \cdot x + \psi(y')$$

$$\varphi(y') \neq y'$$

קיבלנו מד"ר לינארית של  $x$  כפונק' של  $p$  שאנו יודעים לפתור, הפתרון:

$$x = e^{\int \frac{\varphi'(p)}{p - \varphi(p)} dp} \cdot \left[ c + \int \frac{\psi'_p(p)}{p - \varphi(p)} e^{-\int \frac{\varphi'(p)}{p - \varphi(p)} dp} dp \right]$$

$$y = \varphi(p) x(p) + \psi(p)$$

הערה: בפתרון מחלקים ב  $p - \varphi(p)$ , כלומר הנחנו שמתקיים  $p - \varphi(p) \neq 0$ . אם  $p - \varphi(p) = 0$  שורשים של הביטוי אז  $y = p_i x + \psi(p_i)$  גם פתרון.

## 1.16 משוואת קלרו:

$$y = y'x + \psi(y')$$

יש לנו שני פתרונות. הראשון:  $y = xc + \psi(c)$  עבור  $c$  קבוע  
הפתרון השני (פתרון מיוחד):

$$\begin{aligned}x &= -\psi'_p(p) \\ y &= -p\psi'(p) + \psi(p)\end{aligned}$$

## 2 מד"ר לינאריות מסדר גבוה הומוגניות

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$$

1. אם  $f(x) \equiv 0$  אזי המשוואה הומוגנית.
2. אם  $\forall i \ a_i(x) = c_i$  קבוע אזי המשוואה נקראת מד"ר לינארית עם מקדמים קבועים.
3. מרחב הפתרונות של מד"ר לינארית הומוגנית מסדר  $n$  המקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות בתחום  $D$  הוא מרחב וקטורי ממימד  $n$ .

### 2.1 וורונסקיאן:

1. הוורונסקיאן (Wronskian) של הפונק'  $y_1, \dots, y_n$  הוא:

$$W(y_1, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y'_1 & y'_2 & \dots & y'_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

2. אם  $y_1, \dots, y_n$  ת"ל אזי  $W = 0$ .
3. "משפט הפוך": אם  $y_1, \dots, y_n$  הם פתרונות של מד"ר המקיימת את תנאי משפט הקיום והיחידות בתחום  $D$  ומתקיים  $W = 0$  בנק' כלשהי  $x_0 \in D$  אזי הן תלויות לינארית.

### 2.2 משפט ליוביל

אם  $x \in (a, b)$ ,  $y_1(x), \dots, y_n(x)$  פתרונות בת"ל של המד"ר ההומוגנית

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = 0$$

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x a_1(x) dx}$$

לכל  $x_0 \in (a, b)$

## 3 מד"ר לינאריות מסדר גבוה לא הומוגניות

הפתרון יהיה מהצורה:

$$y(x) = y_g(x) + y_p(x)$$

כאשר  $y_g(x)$  הוא הפתרון הכללי של ההומוגנית המתאימה ו  $y_p(x)$  הוא פתרון כלשהו של הלא הומוגנית.

### 3.1 וריאציית הפרמטרים

$$y''' + a_1(x)y'' + a_2(x)y' + a_3(x)y = f(x)$$

פתרון להומוגני:  $c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + c_3y_3(x)$   
 ננחש פתרון מהצורה:  $y(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x) + c_3(x)y_3(x)$   
 פתרון:

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \\ c_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

פורמלית - בשיטת קרמר:

$$c_i' = \frac{\Delta_i}{\Delta}$$

$$c_i = \int dx \left( \frac{\Delta_i(x)}{\Delta(x)} \right)$$

### 3.2 מד"ר לינארית הומוגנית \ לא הומוגנית מסדר גבוה עם מקדמים קבועים

$$y^{(n)} + p_1y^{(n-1)} + p_2y^{(n-2)} + \dots + p_ny = f(x)$$

#### 3.2.1 הומוגני

נקרא הפולינום האופייני של המד"ר.  $r^n + p_1r^{n-1} + \dots + p_n$   
 קיבלנו שאם  $r$  הוא שורש של הפולינום האופייני אזי  $e^{rx}$  פותר את המד"ר.  
 אם יש  $n$  פתרונות ממשיים שונים  $r_1, \dots, r_n$ , אזי הפתרון הכללי למד"ר הומוגנית הוא:

$$y = \sum_{i=1}^n c_i e^{r_i x}$$

אם יש זוג פתרונות מרוכבים צמודים  $r = \alpha \pm i\beta$  אזי

$$c_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + \bar{c}_1 e^{(\alpha-i\beta)x} = \tilde{c}_1 e^{\alpha x} \sin(\beta x) + \tilde{c}_2 e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

אם  $r_1, \dots, r_n$  הם פתרונות הפולינום ניתן לכתוב את המשוואה בצורה:  
 אם  $r$  שורש עם ריבוי  $m$  אז  $x^\ell e^{rx}$  פתרון עבור  $\ell = 0, 1, \dots, m-1$  (נסו להראות באינדוקציה).  
 אם יש שורש מרוכב  $r = \alpha + i\beta$  עם ריבוי  $m$ , אזי  $x^\ell e^{(\alpha \pm i\beta)x}$  או  $x^\ell e^{\alpha x} \cos(\beta x)$  ו  $x^\ell e^{\alpha x} \sin(\beta x)$  פתרונות עבור  $\ell = 0, \dots, m-1$

באופן כללי, אם יש לנו פתרונות  $r_1, \dots, r_m$  בריבויים  $q_1, \dots, q_m$  אזי הפתרון הוא:

$$y = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{q_i-1} c_{ij} x^j e^{r_i x}$$

כאשר  $c_{ij}$  קבועים שרירותיים.

#### 3.2.2 לא הומוגני: שיטה למציאת $y_p$

$$y^{(n)} + p_1y^{(n-1)} + \dots + p_ny = e^{\alpha x} \cdot \begin{cases} \sin \beta x \\ \cos \beta x \end{cases} P_m(x)$$

אם  $\alpha \pm i\beta$  לא שורש פתרון מהצורה:

$$Q_{m_1}(x) e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_{m_2}(x) e^{\alpha x} \sin \beta x$$

אם  $\alpha \pm i\beta$  שורשים מריבוי  $k$  (כ"א) אז נחש פתרון:

$$x^k [Q_{m_1}(x) e^{\alpha x} \cos \beta x + Q_{m_2}(x) e^{\alpha x} \sin \beta x]$$



### 3.2.3 כלל

בגלל הלינאריות של הפתרונות, אם יש לנו את המשוואה:

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = f(x) + g(x)$$

אז נוכל לפתור עבור  $f(x)$  ו  $g(x)$  בנפרד ולסכם את הפתרונות.

### 3.3 משוואת אוילר

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_n y = \begin{cases} 0 \\ f(x) \end{cases}$$

#### 3.3.1 הומוגני

כאשר  $a_1, \dots, a_n = \text{const} \in \mathbb{R}$ .

נציב:  $y = x^r$  (אם מסתכלים על  $x < 0$  אז נציב  $y = (-x)^r$ ). נקבל משוואה אינדיציאלית. נפתור אותה ונמצא את ה  $r$ ים המתאימים. אם כל השורשים שונים נקבל שהפתרון הוא

$$y = \sum_{i=1}^n c_i x^{r_i}$$

עבור  $\ell$  שורשים חוזרים עם ריבוי  $m_j$  (עבור שורש  $r_j$ ) נקבל את הפתרון:

$$y = \sum_{j=1}^{\ell} \sum_{i=1}^{m_j} c_{ij} (\ln x)^{i-1} x^{r_j}$$

עבור שורשים מרוכבים שונים  $r = \alpha \pm i\beta$

$$y = c_1 x^\alpha \cos(\ln \beta x) + c_2 x^\alpha \sin(\ln \beta x)$$

עבור שורשים מרוכבים חוזרים

$$y = \sum_{k=1}^m \left[ c_{1k} x^\alpha (\ln x)^{k-1} \cos(\ln \beta x) + c_{2k} x^\alpha (\ln x)^{k-1} \sin(\ln \beta x) \right]$$

#### 3.3.2 מקרה לא הומוגני - כללים:

1. אם יש משוואה מהצורה:

$$a_0 x^n y^{(n)} + \dots + a_n y = P_\ell(\ln x) x^\alpha$$

כאשר  $P_\ell(\ln x)$  פולינום מדרגה  $\ell$  של  $\ln x$ .

(א) אם  $\alpha \pm i\beta$  לא שורש של המשוואה האינדיציאלית נציב

$$y = Q_\ell(\ln x) x^\alpha$$

כאשר  $Q_\ell$  פולינום מדרגה  $\ell$  עם מקדמים לא ידועים, ונמצא את המקדמים.

(ב) אם  $\alpha$  שורש בריבוי  $m$  נציב:

$$y = (\ln x)^m Q_\ell(\ln x) x^\alpha$$

2. אם יש משוואה מהצורה:

$$a_0 x^n y^{(n)} + \dots + a_n y = P_\ell(\ln x) x^\alpha \frac{\cos(\beta \ln x)}{\sin(\beta \ln x)}$$

כאשר  $P_\ell(\ln x)$  פולינום מדרגה  $\ell$  של  $\ln x$ .

עבור  $\alpha$  שורש בריבוי  $m$  של המשוואה האינדיציאלית נציב ( $m$  יכול להיות 0):

$$y = (\ln x)^m x^\alpha [Q_\ell(\ln x) \sin(\beta \ln x) + S_l(\ln x) \cos(\beta \ln x)]$$

כאשר  $S_l, Q_\ell$  פולינומים מדרגה  $\ell$  עם מקדמים לא ידועים, ונמצא את המקדמים.

#### 4 סיווג נק' סינגולריות

$$\begin{aligned} a_0(x) y'' + a_1(x) y' + a_2(x) y &= 0 \\ y'' + \frac{a_1(x)}{a_0(x)} y' + \frac{a_2(x)}{a_0(x)} y &= 0 \end{aligned}$$

אם ב- $x_0$  יש נקודת סינגולריות, אזי יש לנו בעיה!

$$\begin{aligned} L_1 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left( (x - x_0) \cdot \frac{a_1(x)}{a_0(x)} \right) \\ L_2 &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left( (x - x_0)^2 \frac{a_2(x)}{a_0(x)} \right) \end{aligned}$$

אז בקרבת  $x_0$  נקבל:

$$(x - x_0)^2 y'' + (L_1 + o(1))(x - x_0) y' + (L_2 + o(1)) y = 0$$

וזה פתרון בסביבת

$$(x - x_0)^r$$

#### 5 טור פרוביניוס

$$y = x^r \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+r}$$

אם קיימים הגבולות  $L_1, L_2$  אז הנק'  $x_0$  נקראת סינגולרית-רגולרית. מציבים פתרון בצורת טור פרוביניוס ופותרים עבור  $r$  והמקדמים. (אם זה בסביבת  $x_0$  ולא 0 נציב טור סביב  $x_0$ ).

##### 5.1 הערה:

אם  $r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}$  אז:

$$\begin{aligned} y_1 &= x^{r_1} \sum a_k x^k \\ y_2 &= b y_1(x) \cdot \ln x + x^{r_2} \sum b_k x^k \end{aligned}$$

כאשר  $r_1 \geq r_2$ .

## 6 משוואת בסל

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - m^2)y = 0$$

כאשר נניח ב.ה.כ.  $m \geq 0$   
 $r = \pm m$

1. אם  $r_1 - r_2 = 2m \notin \mathbb{Z}$ :  
 אז לפי פרוביניוס

$$y = c_1 x^m \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + c_2 x^{-m} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

$$a_n = \frac{-a_{n-2}}{n(n-2m)}$$

2. אם  $r_1 - r_2 = 2m \in \mathbb{Z}$ :

הפתרונות תלויים וניתן להשתמש בשיטה של טורי פרוביניוס. לחילופין ניתן להשתמש בפונקציות בסל מהסוג השני:

$$Y_m(x) = \frac{J_m(x) \cos(m\pi) - J_{-m}(x)}{\sin(m\pi)}$$

שהן צירוף לינארי של  $J_m(x)$  ו  $J_{-m}(x)$ . כאשר  $m$  שלם  $J_{-m}(x) = -J_m(x)$ , אבל ניתן להשמש בגבול

$$Y_m(x) = \lim_{\alpha \rightarrow m} \frac{J_\alpha(x) \cos(\alpha\pi) - J_{-\alpha}(x)}{\sin(\alpha\pi)}$$

## 7 מערכות משוואות - לינאריות מסדר 1, הומוגניות, עם מקדמים קבועים

מערכת המשוואות היא:

$$\frac{dy_i}{dx} = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j$$

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

נניח  $\vec{v}_i$  ו"ע של המטריצה  $M$  עם ע"ע  $\lambda_i$  אזי  $\vec{y} = \vec{v}_i e^{\lambda_i x}$  פותר את המשוואה:

$$\vec{y}' = \lambda_i \vec{v}_i e^{\lambda_i x}$$

## 8 מערכות מד"ר מסדר ראשון לינאריות עם מקדמים קבועים לא הומוגניות

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_n(x) \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

נניח  $M$  ניתנת ללכסון, כלומר קיימת  $P$  כך  $P^{-1}MP = D$  ש  $P$  אלכסונית. נגדיר

$$\begin{aligned} \vec{y} &= P \cdot \vec{z} \\ \vec{z} &= P^{-1} \vec{y} \end{aligned}$$

$$\vec{z} = D \vec{z} + P^{-1} \vec{g}(x)$$

### 8.1 פתרון מערכת לינארית לא הומוגנית עם מקדמים קבועים באמצעות אקספוננט של מטריצה

$$\vec{y}' = M\vec{y} + \vec{g}$$

$$\vec{y} = \exp(Mx) \left[ \int \exp(-Mu) \vec{g} du + \vec{c} \right] = \int \exp[M(x-u)] \vec{g} du + \exp(Mx) \vec{c}$$

## 9 שיטות לפתרון מערכות:

### 9.1 שיטת ההצבה

$$\begin{aligned} y_1' &= g(y_1, y_2) \\ y_2' &= h(y_1, y_2) \\ \frac{dy_1}{dy_2} &= \frac{y_1'}{y_2'} = \frac{g(y_1, y_2)}{h(y_1, y_2)} \end{aligned}$$

### 9.2 שיטת החילוץ

## 10 פתרון מד"ר באמצעות התמרות לפלס\פורייה

התמרת לפלס:

$$g(s) = L(f(t)) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

התמרה הפוכה:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{c+ist} g(s) ds$$

כאשר  $c$  נמצאת מימין לכל קוטב של  $g(s)$ .

$$L(f'(t)) = -f(0) + sL(f(t))$$

## 11 בעיות שפה

לבעיות שפה לא בהכרח יש פתרון, ואם יש הוא לא בהכרח יחיד, לעומת בעיות קושי.

## 12 בעיית שטורם ליוביל

המד"ר:

$$-(P(x)y')' + Q(x)y = f(x)$$

אם  $P, Q$  רציפות וגזירות בקטע  $(a, b)$  וכן  $P(x) > 0$  בקטע, המד"ר נקרא משוואת שטורם ליוביל.

### הערה

בהינתן המד"ר

$$R(x)y'' + S(x)y' + T(x)y = f(x)$$

ניתן להפוך אותו לצורה של שטורם ליוביל ע"י כפל בגורם אינטגרציה:  $\mu = c \cdot e^{\int \frac{S(x)-R'(x)}{R(x)} dx}$