

אינפי 1 - תרגיל 2

1. הוכח ש $\sqrt{3}$ אינו רציונאלי

פתרון:

נניח בשלילה ש $\sqrt{3}$ רציונאלי, לכן הוא שווה לשבר המצומצם $\frac{p}{q} = \sqrt{3}$ נעלה בריבוע $p^2 = 3q^2$. לכן p מתחלק בשלוש, כלומר $p = 3p'$ עבור p' כלשהוא, לכן $p^2 = 9p'^2 = 3q^2$ לכן $3p' = q$ לכן q גם מתחלק ב 3 כמו p בסתירה לכך שהשבר מצומצם.

2. יהי $x \in \mathbb{R}$ מספר ממשי המקיים $x \geq 0$. נניח בנוסף $x < \varepsilon$ ו $\forall \varepsilon > 0$. הוכח/הפוך: $x = 0$.

הוכחה:

נניח בשלילה $x \neq 0$, לכן לפי הנתון $x > 0$. ניקח $\varepsilon = \frac{x}{2}$, לכן $0 < \varepsilon < x$ בסתירה לנתון שכל $0 < \varepsilon$ מקיים $x < \varepsilon$.

3. תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ כך שקיים $\varepsilon > 0$ כך ש $\forall a \in A : a > \varepsilon$ הוכח שאפס אינו החסם התחתון של A .

הוכחה:

נניח בשלילה שאפס הינו החסם התחתון של A . ניקח $0 < \frac{\varepsilon}{2}$. ברור ש $\frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ ולכן $\forall a \in A : a > \frac{\varepsilon}{2}$ כלומר $\frac{\varepsilon}{2}$ חסם מלרע גדול מאפס, בסתירה לכך שאפס הינו החסם מלרע הגדול ביותר.

4. תהיי $B = \left\{ (-1)^{n-1} \left(2 + \frac{3}{n} \right) \mid n \in \mathbb{N} \right\}$. מצא חסם עליון, חסם תחתון, מינימום ומקסימום (כאשר הם קיימים)

תשובה: מקסימום 5, מינימום $-3\frac{1}{2}$

5. יהיו קבוצות לא ריקות $A, B \subseteq \mathbb{R}$, נניח שמתקיים $\forall a \in A, \forall b \in B : a \leq b$ (כל איבר ב A קטן שווה מכל איבר ב B)

*א. הוכח: $\sup A \leq \inf B$ (תרגיל חשוב מאד. יש להשתמש באפסילון)

פתרון: נניח בשלילה ש $\sup A > \inf B$ ניקח $\varepsilon = \frac{\sup A - \inf B}{2} > 0$ אזי

$\sup A - \varepsilon = \frac{\sup A + \inf B}{2}$ שזה אמצע הקטע $[\inf B, \sup A]$. אבל לפי משפט קיים $a \in A$ כך ש $a > \sup A - \varepsilon$.

$$\inf B + \varepsilon = \frac{\sup A + \inf B}{2} = \sup A - \varepsilon$$

אבל לפי משפט קיים $b \in B$ כך ש $b < \inf B + \varepsilon = \sup A - \varepsilon < a$. ובסיכום מצאנו $b < a$ בסתירה לנתון.

ב. נניח שמתקיים שיוויון בסעיף א', כלומר, $\sup A = \inf B$. הוכח/הפוך: $A \cap B \neq \emptyset$.
(במילים: יש איבר שנמצא גם ב A וגם ב B).

הפרכה: ניקח $A = (0,1)$ ו- $B = (1,2)$. $\sup A = \inf B = 1$. אבל $A \cap B = \emptyset$.

ג. אם הוכחת בסעיף ב', מה הוא האיבר המשותף ל A ו B ? אם הפרכת, מתי כן יהיה לשתי הקבוצות איבר משותף?

תשובה: האיבר המשותף יתקיים כאשר ל A יהיה מקסימום, ול B יהיה מינימום. ואז $\sup A \in A$ ו $\inf B \in B$.

6. תהי $A \subseteq \mathbb{R}$, נתון $0 \notin A$. נגדיר את הקבוצה A^{-1} באופן הבא $A^{-1} = \left\{ \frac{1}{a} \mid a \in A \right\}$. הוכח או הפוך על ידי דוגמא נגדית:

א. אם A חסומה מלעיל אזי A^{-1} חסומה מלעיל

ב. אם A חסומה מלעיל אזי A^{-1} חסומה מלרע

ג. אם A^{-1} חסומה מלעיל אזי A חסומה מלעיל

ד. אם A^{-1} חסומה מלעיל אזי A חסומה מלרע

הפרכה: ניקח $A = (-1,0) \cup (0,1) = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 0, \text{ or } 0 < x < 1\}$. A חסומה על ידי ± 1 . אבל A^{-1} אינה חסומה מלעיל ואינה חסומה מלרע (שכן אחד חלקי מספר קטן חיובי הולך לאינסוף, ואחד חלקי מספר קטן שלילי הולך למינוס אינסוף). $(A^{-1})^{-1} = A$. ולכן גם הכיוונים הפוכים לא נכונים.

7. תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה חסומה מלעיל. נגדיר $B = \{-a \mid a \in A\}$ הוכח ש B חסומה מלרע וש-
 $\inf B = -\sup A$

פתרון: A חסומה מלעיל, נניח על ידי M כלומר $\forall a \in A: a \leq M$ לכן $\forall a \in A: -M \leq -a$ כלומר B חסומה מלרע ע"י $-M$. כמו כן, אם M הינו חסם המלעיל הקטן ביותר של A , וודאי ש $-M$ הינו חסם המלרע הקטן ביותר של B (קל להוכיח).

8. תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ כך ש $\forall a \in A : a > 0$ ותהי $A^{-1} = \left\{ \frac{1}{a} \mid a \in A \right\}$.

הוכח ש m חסם תחתון של $A \Leftrightarrow \frac{1}{m}$ חסם עליון של A^{-1} (ואפס חסם תחתון של A אם"ם A^{-1} לא חסומה).

הוכחה: דבר ראשון, אם $m = 0$ אזי A^{-1} לא חסומה כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש $a < 0 + \varepsilon = \varepsilon$ (כי $m = 0$ חסם תחתון) לכן לכל $M > 0$ ניקח $\varepsilon = \frac{1}{M}$ ולכן קיים $a \in A$ כך ש $a < \varepsilon = \frac{1}{M}$ ולכן $\frac{1}{a} > M$ כלומר A^{-1} לא חסומה. בכיוון ההפוך, אם A^{-1} לא חסומה אז לכל $M > 0$ קיים $a \in A$ כך ש $\frac{1}{a} > M$. לכן לכל $\varepsilon > 0$ ניקח $M = \frac{1}{\varepsilon}$ ולכן קיים $a \in A$ כך ש $M > 0$ קיים $a \in A$ כך ש $\frac{1}{a} > M = \frac{1}{\varepsilon}$ ולכן $a < \varepsilon$. נובע מכך החסם התחתון של A הוא אפס כי הוא חסם מלרע שמקיים את התנאי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש $a < 0 + \varepsilon$.

כעת, נניח $m \neq 0$ לכן $\forall a \in A : m \leq a$ ולכן $\forall a \in A : \frac{1}{a} \leq \frac{1}{m}$ כלומר $\frac{1}{m}$ חסם מלעיל של A^{-1} . נניח M_1 חסם מלעיל קטן יותר ל A^{-1} כלומר $M_1 < \frac{1}{m}$ ו $\forall a \in A : \frac{1}{a} \leq M_1$. אבל אז $\forall a \in A : \frac{1}{M_1} \leq a$ כלומר $\frac{1}{M_1}$ חסם מלרע של A . אבל $M_1 < \frac{1}{m}$ ולכן $\frac{1}{M_1} > m$ בסתירה לכך ש m חסם תחתון.

בכיוון ההפוך, נניח $\frac{1}{m}$ חסם עליון של A^{-1} . נגדיר $B = A^{-1}$ ולכן $B^{-1} = A$ והטענה נובעת מהכיוון שהוכחנו.