

תרגיל בית 11

1. התסתכלו על הפונקציה הבאה המוגדרת על $[-1,1]$:

$$f = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

- א. האם הפונקציה גזירה?
- ב. האם הפונקציה רציפה ליפשיץ?
- ג. האם לפונקציה השתנות חסומה?

פתרון:

א. הפונקציה כמובן גזירה והנגזרת הינה

$$f' = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{x} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

נראה רק כי הפונקציה אכן גזירה ב $x = 0$. מתקיים $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{h^2}\right)}{h} = 0$

ב. מכיוון שהנגזרת f' איננה חסומה בקטע $[-1,1]$ נובע כי לכל $M, \varepsilon > 0$ קיים

$$-1 \leq x_0 \leq 1 \text{ כך ש } f'(x_0) > M + \varepsilon \text{ מכאן שקיים } h > 0 \text{ כך ש}$$

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} > M \text{ ומכאן שהפונקציה איננה רציפה ליפשיץ.}$$

ג. מספיק לבדוק מהן התנודות בין הנקודות בהן הנגזרת מתאפסת. נשווה את הנגזרת ל 0 ונקבל

$$2x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{x} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0 \Leftrightarrow \tan\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2}$$

עבור $x \approx 0$ נקבל כי $\frac{1}{x^2} \rightarrow \infty$ ולכן פתרונות המשוואה באופן אסימפטוטי יהיו

$$x \approx \sqrt{\frac{2}{\pi + 2\pi k}} \text{ עבור } k \in \mathbb{Z} \text{ גדול. מכאן ש } \frac{1}{x^2} \approx \frac{\pi}{2} + \pi k$$

$x = 0$ של הפונקציה יהיו

$$TV(f) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi + 2\pi(k+1)} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi(k+1)\right) - \frac{2}{\pi + 2\pi k} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{\pi + 2\pi 2k} + \frac{2}{\pi + 2\pi(2k-1)}$$

ברור כי הטור האחרון מתבדר כמו טור הרמוני ולכן לפונקציה אין השתנות חסומה.

2. נניח f הינה פונקציה רציפה על $[0,1]$ ו f רציפה בהחלט על $(a,1]$ לכל $a \in (0,1)$. האם

f בהכרח רציפה בהחלט על $[0,1]$? אם בנוסף f הינה בעלת השתנות חסומה ב $[0,1]$ האם אז f הינה רציפה בהחלט על $[0,1]$? אם לא, תנו דוגמא נגדית.

פתרון: ניקח לדוגמא את הפונקציה בשאלה הראשונה. מכיוון ש f תהיה אז גזירה ברציפות בקטע $(a,1]$ לכל $a \in (0,1)$ אזי היא רציפה ליפשיץ ולכן רציפה בהחלט. אבל מכיוון שאיננה בעלת השתנות חסומה בקטע $[0,1]$ אז נובע כי איננה רציפה בהחלט בקטע $[0,1]$. לעומת זאת, אם בנוסף f בעלת השתנות חסומה בקטע $[0,1]$ נובע כי f גזירה בקטע $[0,1]$ ולכן

$$\int_0^x f' \leq f(x) - f(0) \text{ אבל } f \text{ רציפה בהחלט על } (a,1] \text{ ולכן}$$

$$\int_0^x f' = \int_0^a f' + \int_a^x f' = \int_0^a f' + f(x) - f(a)$$

האינטגרל נובע כי

$$\int_0^x f' = f(x) - f(0) \text{ ולכן בסה"כ נקבל כי } \lim_{a \rightarrow 0} \int_0^a f' + f(x) - f(a) = f(x) - f(0)$$

כלומר f רציפה בהחלט.

3. נניח f הינה רציפה בהחלט על $[0,1]$ ולכל $A \subseteq [0,1]$ נגדיר $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$.

הראו כי אם A הינה בעלת מידת לבג 0 אזי $f(A)$ בעלת מידת לבג 0.

פתרון: מכיוון ש f רציפה בהחלט נובע כי היא בעלת השתנות חסומה ולכן ניתן לפרק אותה להפרש של שתי פונקציות עולות. מכיוון ש f רציפה בהחלט, ניתן להראות כי $f = f_1 - f_2$ כאשר f_1, f_2 רציפות בהחלט ועולות. מכיוון ש $m(A) = 0$ נובע כי נוכל למצוא קבוצה פתוחה

$$A \subseteq O \text{ כך ש } m(O) < \varepsilon \text{ . נוכל לרשום } O = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \text{ כאשר } \{I_n\} \text{ קטעים זרים. מכיוון ש } f_1$$

הינה פונקציה עולה נובע כי $\{f_1(I_n)\}$ הינם קטעים(אולי טריויאליים) זרים (אולי פרט לנקודון)

וכי

$$m(f_1(A)) = m\left(\bigcup_i f_1(I_i)\right) \ll f_1(A) \subseteq \bigcup_i f_1(I_i)$$

מכיוון ש f_1 עולה ורציפה ברור כי המידה של תמונה של קטע (x_1, x_2) תהיה $f(x_2) - f(x_1)$

נסמן $I_n = (a_n, b_n)$, f_1 רציפה בהחלט ולכן קיימת הנגזרת f_1' וכן

$$\int_{a_i}^{b_i} f_1' dm = f_1(b_i) - f_1(a_i)$$

$$\begin{aligned} m\left(\bigcup_i f_1(I_i)\right) &= \sum_{i=1}^{\infty} m(f(I_i)) = \sum_{i=1}^{\infty} f_1(b_i) - f_1(a_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{a_i}^{b_i} f_1' dm \\ &= \int_0 f_1' dm \end{aligned}$$

כאשר השייון האחרון נובע מכך ש $f' \geq 0$ כב"מ. מכאן ש

$$m(O) \rightarrow 0 \Rightarrow \int_0 f_1' dm \rightarrow 0$$

ומכאן ש $m(f_1(O)) \rightarrow 0$. באותו אופן נראה כי $m(f_2(O)) \rightarrow 0$ נסמן ב

$$f_1(I_i) = (a_i^1, b_i^1), f_2(I_i) = (a_i^2, b_i^2)$$

$$f((a_i, b_i)) \subseteq (b_i^1 - a_i^2, a_i^1 - b_i^2)$$

$$\Rightarrow m(f((a_i, b_i))) \leq b_i^1 - a_i^2 - (a_i^1 - b_i^2) = m(f_1((a_i, b_i))) + m(f_2((a_i, b_i)))$$

$$\Rightarrow m(f(A)) \leq m(f(O)) \leq m(f_1(O)) + m(f_2(O)) \xrightarrow{m(O) \rightarrow 0} 0$$

מכאן ש $m(f(A)) = 0$. מש"ל.