תרגיל 1

1) כתוב את טבלת האמת של הפסוקים הבאים:

א) $(p \vee q) \wedge (\neg r)$

ב) $(p \vee q) \wedge (\neg(q \wedge r))$

ג) $(p \vee \neg q \vee r) \wedge q$

2) הבחן: א) בין משפט לבין הנחה שאנו יודעים שאינה נכונה.

ב) אני חושב ויש לי חתול שמשפט זה או קיים כזה.

3) הוכח את השקילויות הבאות: א) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

ב) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

ג) $(p \rightarrow q) \vee (\neg p \rightarrow r) \equiv p \vee r$

"כלל בית מרפאן נשבר".

4) ראינו בהרצאה כי אם לשתי פסוקים φ_1, φ_2 מקבלי ערך T אזי לפחות לאחד מהפסוקים $\varphi_1 \wedge \varphi_2$, $\varphi_1 \vee \varphi_2$ מקבלי ערך T.
בדומה ראינו כי בכדי שפסוק $\varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \varphi_3$ יקבל ערך T אם לפחות אחד מהפסוקים $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ מקבלי ערך T.
האם תוכלו להמציא פסוק מורכב A המורכב מהפסוקים האטומיים: p_1, p_2, p_3 כך ש:
אם A מקבל T אזי לפחות 2 מתוך p_1, p_2, p_3 מקבלי ערך T, ולהיפך. (אם ורק אם).
בכדי עליכם למצוא פסוק A התלוי את טבלת האמת הבאה:

p_1	p_2	p_3	A
T	T	T	T
T	T	F	T
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F