

תרגול 4

1. תהי f פונקציה מדידה לבג. הראו כי קיימת פונקציה מדידה בורל g כך ש $g = f$ כמעט בכל מקום.

פתרון: ראינו כי אם f מדידה לבג אזי קיימת סדרה של פונקציות פשוטות f_n כך ש $f_n \rightarrow f$. נסמן $f_n = \sum_{i=1}^n c_n 1_{A_i^n}$ כאשר c_n מספרים ממשיים ו A_n קבוצות מדידות לבג. למדנו שהאיפיון של קבוצות לבג הוא שניתן למצוא לכל קבוצה מדידה לבג A קבוצה מדידה בורל $E (G_\delta)$ כך ש $E = A \cup F$, $m(F) = 0$, $F \cap A = \emptyset$. מכאן שנוכל למצוא לכל A_i^n קבוצה מדידה בורל E_i^n כך ש $E_i^n = A_i^n \cup F_i^n$, $m(F_i^n) = 0$ ו $F_i^n \cap A_i^n = \emptyset$. כעת נגדיר את הפונקציה הפשוטה $g_n = \sum_{i=1}^n d_n 1_{E_i^n}$. מההגדרה של E_i^n פונקציה זו מדידה בורל. כעת נגדיר את הקבוצה $B = \{x : \lim g_n(x) \neq f(x)\}$, ונשים לב כי אם $f_n(x) = g_n(x)$ לכל n אז $x \in B^c$ מכאן ש $B \subseteq B' = \{x : \exists n, f_n(x) \neq g_n(x)\}$. נשים לב כי $B' = \bigcup_{i,n} F_i^n$, מכאן ש $m(B) \leq m(B') = m\left(\bigcup_{i,n} F_i^n\right) \leq \sum_{i,n} m(F_i^n) = 0$. נגדיר את הפונקציה g ע"י $\lim g_n(x) = g(x)$ על B^c ו $g = 0$ על B וכבר ראינו שאז g הינה מדידה בורל שכן g_n הינן כאלו. כמו כן, קל לראות כי $g = f$ כב"מ מכאן ש g הינה הפונקציה הדרושה.

2. תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ מדידה לבג. אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיימת פונקציה רציפה $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אשר מתאפסת מחוץ לקבוצה חסומה ו $\int |f - g| dm < \varepsilon$.
פתרון: נוכיח זאת בכמה שלבים:

א. אם $-\infty < a < b < \infty$ אזי לכל $\delta \in \left(0, \frac{b-a}{2}\right)$ ונסתכל על הפונקציות $\tau_{a,b,\delta}$ אשר

מקבלות 1 על $(a + \delta, b - \delta)$, $x \in (a + \delta, b - \delta)$, 0 מחוץ לקטע (a, b) ולינאריות $[a, a + \delta]$ ו $[b - \delta, b]$. ברור כי לכל קטע (a, b) נוכל לבחור קטע $(a + \delta, b - \delta)$ כך ש $\int |\tau_{a,b,\delta} - 1_{(a,b)}| dm < \varepsilon$. מכאן ש $m((a,b) \setminus (a + \delta, b - \delta)) < \varepsilon$.

ב. ראינו בהרצאה כי אם E מדידה לבג ו $m(E) < \infty$ אז ניתן למצוא קטעים זרים ופתוחים

כך ש I_1, I_2, \dots, I_l $m\left(E \Delta \bigcup_{i=1}^l I_i\right) < \frac{\varepsilon}{2}$. מכאן ש $\int \left| \sum_{i=1}^l 1_{I_i} - 1_E \right| dm < \frac{\varepsilon}{2}$. מצד שני עפ"י

משראינו נובע כי ניתן לבחור δ כזאת כך ש $\int |\tau_{I_i, \delta} - 1_{I_i}| dm < \frac{\varepsilon}{2l}$ ומכאן ש

$$\int \left| \sum_{i=1}^l \tau_{I_i} - \sum_{i=1}^l 1_{I_i} \right| dm < \sum_{i=1}^l \frac{\varepsilon}{2l} = \frac{\varepsilon}{2}$$

ועכשיו, אם נסמן $\psi = \sum_{i=1}^l \tau_{I_i}$, נובע כי

$$\int |\psi - 1_E| dm < \varepsilon$$

ג. למדנו כי אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ אינטגרבילית אז קיימת פונקציה $\varphi = \sum_{i=1}^N c_k I_{E_i}$ פשוטה

ואינטגרבילית כך ש $\int |\varphi - f| dm < \frac{\varepsilon}{2}$. מהעובדה כי φ אינטגרבילית נובע כי

$m(E_i) < \infty$ לכל i . עפ"י שלב ב נוכל למצוא פונקציה ψ_j רציפה כך ש

$$\int |\psi_j - 1_{E_j}| dm < \frac{\varepsilon}{2N|c_j|}$$

נסמן $\phi = \sum_{j=1}^l \psi_j$ וקיבלנו

$$\int |g - f| dm = \int |g - \psi| dm + \int |f - \psi| dm$$

$$\leq \sum_{j=1}^N \int |c_j \psi_j - c_j 1_{E_j}| dm + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\leq \sum_{j=1}^N |c_j| \frac{\varepsilon}{2N|c_j|} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

למת פאטו

תזכורת: ראינו בהרצאה את למת פאטו האומרת שאם $f_n: X \rightarrow [0, \infty]$, פונקציות מדידות אזי

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

מתקיים

דוגמה לאי שוויון חזק:

נתבונן בממ"ח (\mathbb{R}, L, m) , ונגדיר סדרת פונקציות פשוטות ע"י $f_n(x) = \frac{1}{n}$. קל לראות:

$$\lim f_n = 0 \quad .1$$

$$2. \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu = \infty \quad n \text{ לכל}$$

ולכן האי-שוויון בלמת פאטו הוא חזק: $0 < \infty$.

3. תרגיל (למת פאטו ההפוכה): הוכיחו כי אם $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ פונקציות מדידות המוגדרות על הממ"ח (X, S, μ) . אם קיימת פונקציה אינטגרבילית g לכל n , אזי

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

פתרון: נסתכל על סדרת הפונקציות $h_n = g - f_n$, זוהי כמובן סדרה חיובית. בנוסף, האינטגרל

$$\int_X h_n d\mu = \int_X (g - f_n) d\mu = \int_X g d\mu - \int_X f_n d\mu$$

$$\begin{aligned} \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} (g - f_n) d\mu &= \int_X \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} g + \liminf_{n \rightarrow \infty} (-f_n) \right) d\mu \\ &= \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} g d\mu + \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} (-f_n) d\mu = \int_X g d\mu - \int_X \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (g - f_n) d\mu \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X g d\mu + \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X -f_n d\mu = \int_X g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \\ &\Rightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \end{aligned}$$

4. אם f_n הינה סדרה של פונקציות אי-שליליות ואינטגרליות כך ש $f_n \downarrow f$, הראו כי

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

פתרון: עפ"י למת פאטו נובע כי $\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_X f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$

מצד שני, עפ"י למת פאטו ההפוכה, נובע כי $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \int_X f d\mu$

לסיכום, קיבלנו $\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$, ומכאן ש $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$

התכנסות נשלטת

תזכורת: יהיו $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ פונקציות מדידות כך ש $f_n \rightarrow f$, ונניח וקיימת פונקציה אינטגרבילית g לכל n אזי f_n ו f אינטגרביליות ומתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f$$

5. תהי $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית ותהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה, מדידה (לבג) ורציפה בנקודה

$$x_0 = 1 \text{ הוכיחו שהגבול } I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n f \left(1 + \frac{x}{n^2} \right) g(x) dx \text{ קיים, וחשבו אותו.}$$

פתרון: נוכל לרשום את האינטגרל בצורה הבאה: $\int_{\mathbb{R}} f \left(1 + \frac{x}{n^2} \right) g(x) I_{(-n,n)}(x) dx$

$$. h_n(x) = f \left(1 + \frac{x}{n^2} \right) g(x) I_{(-n,n)}(x) \text{ נגדיר את סדרת הפונקציות המדידות}$$

$$f \text{ רציפה בנקודה 1 ולכן } \lim_{n \rightarrow \infty} f \left(1 + \frac{x}{n^2} \right) = f(1) \text{ וקיימת פונקציית הגבול}$$

$$. h = f(1) g(x) I_{(-\infty, \infty)}(x) = f(1) g(x) \text{ יהי } M \text{ חסם של } f \text{ לכל } x \in \mathbb{R} \text{ מתקיים}$$

$|h_n(x)| \leq M |g(x)|$ והפונקציה באגף ימין אינטגרבילית. ע"פ משפט ההתכנסות הנשלטת הגבול

$$\text{הוא } f(1) \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx$$

6. תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרבילית, $a \in \mathbb{R}$ ונגדיר עבור $x > a$

$$F(x) = \int_{[a,x]} f dm$$

הראו כי F רציפה.

פתרון: ניקח סדרה $a < x_n \rightarrow x$. נגדיר $h_n = f 1_{[a,x_n]}$ וברור כי $h_n \rightarrow f 1_{[a,x]}$ או $h_n \rightarrow f 1_{[a,x]}$ אשר שוות כב"מ ולכן האינטגרל שלהן זהה. כעת, מכיוון שהסדרה x_n מתכנסת נובע כי מ

n מסויים $x_n < M$, כאשר $x < M \in \mathbb{R}$. נשים לב כי $|h_n| \leq |f| 1_{[a,M]}$ וכן $|f| 1_{[a,M]}$ אינטגרבילית.

מכאן שכל התנאים להתכנסות הנשלטת מתקיימים ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[a,x_n]} f dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n dm = \int_{[a,x]} f dm = F(x)$$