

רשימת משפטים וטענות

- 1 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. $\lambda = 0$ ערך עצמי של A אם ורק אם A לא הפיכה.
- 2 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של A אם ורק אם: $\det(\lambda \cdot I_n - A) = 0$.
- 3 יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אם $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של T , v וקטור עצמי של T המתאים לערך העצמי λ , אזי λ הוא גם ערך עצמי של A , המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס B , $[v]_B$ וקטור עצמי של A המתאים לערך העצמי λ .
- 4 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של A . אז: המרחב העצמי V_λ הוא תת מרחב וקטורי של \mathbb{F}^n .
- 5 יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של T . אז: המרחב העצמי V_λ הוא תת מרחב וקטורי של V .
- 6 כפל עמודה - עמודה: תהיינה $A_{n \times m}, B_{m \times k}$ מטריצות. אז: $C_i(A \cdot B) = A \cdot C_i(B)$ לכל $1 \leq i \leq k$.
- 7 נסמן: $e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$: אז $A \cdot e_i = C_i(A)$.
- 8 תהי $A_{n \times n}$ הפיכה. נסמן $A = (v_1 \cdots v_n)$. אז: $A^{-1} \cdot v_i = e_i$, $\forall 1 \leq i \leq n$.
- 9 דמיון מטריצות הינו יחס שקילות.
- 10 יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. יהיו B, B' שני בסיסים ל- V . יהיו A, A' שתי מטריצות מייצגות של T ביחס לבסיסים B, B' בהתאמה. תהי P מטריצת המעבר בין הבסיסים B' ו- B . אז: $A' = P^{-1} \cdot A \cdot P$.
- 11 מחלקת שקילות של יחס הדמיון הן כל המטריצות המייצגות את אותה העתקה.
- 12 לכסון מטריצות יכול להיות יעיל בחישוב חזקה של גדולה של מטריצה.
- 13 תכונות של מטריצות דומות: יהיו $A, A' \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש: $A' \sim A$. מתקיים:
 - $\det(A) = \det(A')$
 - $p_A(x) = p_{A'}(x)$
- 14 למטריצות דומות יש אותה דרגה.
- 15 למטריצות דומות יש אותם ערכים עצמיים.
- 16 אם $A_{n \times n}$ לכסינה, אזי יש לה n ערכים עצמיים (ייתכן שחלקם שווים).
- 17 קריטריון כללי ללכסון מטריצה: מטריצה $A_{n \times n}$ לכסינה אם ורק אם במרחב \mathbb{F}^n קיים בסיס המורכב מווקטורים עצמיים של A . איברי בסיס זה הינם עמודות של מטריצה מלכסנת P .

- 18 קריטריון כללי ללכסון אופרטור: אופרטור $T: V \rightarrow V$ ניתן ללכסון \Leftrightarrow במרחב V קיים בסיס B המורכב מווקטורים עצמיים של T .
- 19 אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי, אז ניתן להגדיר את הפולינום האופייני שלו.
- 20 תהי $A_{n \times n}$ מטריצה כלשהי. מתקיים:
- $\deg p_A(x) = n$.
 - $p_A(x)$ הינו פולינום מתוקן.
 - אם $p_A(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ אזי:
 - $a_0 = (-1)^n \det(A)$, $a_{n-1} = -\text{tr}(A)$.
- 21 ע"ע $\text{tr}(A) = \sum$ (כולל ריבוי אלגברי).
- 22 ע"ע $\det(A) = \prod$ (כולל ריבוי אלגברי).
- 23 $n - \text{rank}(A) =$ ריבוי גאומטרי של ערך עצמי 0.
- 24 אם $f(x), g(x)$ פולינומים, $\deg g(x) = m$ אזי קיימים פולינומים $q(x), r(x)$ כך ש-
- $$f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$
- כך ש $\deg r < m$ או $r \equiv 0$.
- 25 משפט bezout: אם a הוא שורש של פולינום f , אזי $f(x)$ מתחלק ל- $x - a$ ללא שארית, ז"א: $f(x) = q(x) \cdot (x - a)$.
- 26 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של A . מתקיים: $1 \leq k_\lambda \leq n$.
- 27 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של A . מתקיים: $1 \leq m_\lambda \leq n$.
- 28 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של A . מתקיים: $k_\lambda \geq m_\lambda$.
- 29 ווקטורים עצמיים המתאימים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים לינארית.
- 30 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. אם ל- A יש n ערכים עצמיים שונים, אזי A לכסינה.
- 31 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ מטריצה כך ש- $p_A(x)$ מתפרק למכפלה של גורמים ליניאריים. אזי: A לכסינה \Leftrightarrow לכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ של A מתקיים $k_\lambda = m_\lambda$.
- 32 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. אם A לכסינה, אזי בהכרח $p_A(x)$ מתפרקת לחלוטין.
- 33 יהי $T: V \rightarrow V$ כך ש- $p_T(x)$ מתפרק לחלוטין. אזי: T ניתן ללכסון \Leftrightarrow לכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ של T מתקיים $k_\lambda = m_\lambda$.
- 34 יהי $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. אזי, מתקיים המשפט היסודי של אלגברה: כל פולינום מעל המרוכבים מתפרק למכפלה של גורמים לינאריים.
- 35 מטריצה משולשת עליונה דומה למטריצה משולשת תחתונה.
- 36 קריטריון שילוש: מטריצה $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ניתנת לשילוש אם ורק אם הפולינום האופייני $p_A(x)$ מתפרק למכפלה של גורמים לינאריים.
- 37 כל מספר חיובי ניתן להצגה יחידה $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_s$, כש- p_i מספרים ראשוניים.
- 38 כל פולינום $f(x)$ ניתן להצגה יחידה $f = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_s$, כש- p_i פולינומים אי פריקים.
- 39 לכל m, n קיימים מספרים q, r כך ש- $m = q \cdot n + r$, כש- $0 < r < n$ או $r = 0$.

- 40 לכל f, g קיימים פולינומים q, r כך ש- $f = q \cdot g + r$, כש- $\deg r < \deg g$ או $r \equiv 0$.
- 41 לכל מטריצה קיים פולינום מאפס.
- 42 משפט קיילי המילטון: תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ מטריצה ריבועית. מתקיים $p_A(A) = 0_{matrix}$.
- 43 לכל מטריצה קיים פולינום מינימלי יחיד.
- 44 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. מתקיים: $m_A(x) | p_A(x)$.
- 45 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. יהי $f(x)$ פולינום מאפס ל- A . אז: לפולינום האופייני $p_A(x)$ מתקיים:

$$p_A(x) | [f(x)]^n$$
- 46 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. מתקיים: $p_A(x) | [m_A(x)]^n$.
- 47 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. השורשים של $m_A(x)$ הם הערכים העצמיים של A .
- 48 תהי $A_{n \times n}$ מטריצה כך שיש לה n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.
 אז: $m_A(x) = p_A(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n)$
- 49 תהי $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. הפולינום המינימלי מחלק כל פולינום שמתאפס ב- A .
- 50 נניח ש- A, \tilde{A} מטריצות ריבועיות דומות. יהי $f(x)$ פולינום מאפס ל- A .
 אז: $f(x)$ פולינום מאפס גם ל- A' .
- 51 למטריצות דומות יש אותו פולינום מינימלי.
- 52 תהי A מטריצה אלכסונית בלוקים. יהיו $p_1(x), p_2(x), \dots, p_s(x)$ פולינומים אופייניים של A_1, \dots, A_s ו- $m_1(x), \dots, m_s(x)$ פולינומים מינימליים שלהן. אזי לפולינום האופייני $p_A(x)$ ולפולינום המינימלי $m_A(x)$ של A מתקיימים השוויונות הבאים:

$$p_A(x) = p_1(x) \cdots p_s(x) \quad \bullet$$

$$m_A(x) = l.c.m(m_1(x), \dots, m_s(x)) \quad \bullet$$
- 53 יהי \mathbb{K} שדה ויהי $\mathcal{R} = \mathbb{K}[x]$ חוג פולינומים (נתבונן בשתי פעולות חיבור, \oplus , וכפל, \otimes) במשתנה אחד. אזי מתקיים:
- האיברים ההפוכים ב- \mathcal{R} הינם פולינומים קבועים (שונים מאפס) (כלומר, חוג דומה לשדה, פרט לתכונה לפיה לכל איבר שונה מאפס קיים איבר הופכי).
 - ב- $\mathcal{R} = \mathbb{K}[x]$ אין מחלקי אפס (כלומר, אם $f \neq 0, g \neq 0$, אזי $f \cdot g \neq 0$).
- 54 כל פולינום מתפרק למכפלה של פולינומים אי פריקים, והצגה זו יחידה, במובן הבא: לכל פולינום f קיימת הצגה בצורה $f = u \cdot g_1 \cdots g_n$, כך ש- u פולינום הפיך (פולינום קבוע עפ"י ההערה לעיל) ו- g_1, \dots, g_n פולינומים אי פריקים, ואם $f = u' \cdot h_1 \cdots h_m$ הצגה נוספת (u' הפיך ו- h_1, \dots, h_m אי פריקים), אזי: $n = m$ ומתקיים $g_i = h_i$ (עד כדי שינוי סדר של גורמים).
- 55 יהיו a, b פולינומים. אז: $g.c.d(a, b)$ קיים ויחיד.

56 יהיו a, b פולינומים. יהי $d = g.c.d(a, b)$. אזי קיימים $u, v \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים:
 $d = au + bv$

לכן, אם $d = 1$ (a, b זרים) אזי קיימים $u, v \in \mathbb{R}$ כך ש- $1 = au + bv$.

57 יהיו a, b, c פולינומים. אם $a|bc$ ואם $g.c.d(a, b) = 1$ אזי $a|c$.

58 יהיו b, c פולינומים. יהי p פולינום אי פריק. אזי, אם: $p|bc$ או $p|b$ או $p|c$.

59 לפולינומים במשתנה אחד מעל שדה, מתקיים פירוק יחיד. ז"א, אם:

$$f = p_1 \cdots p_m = q_1 \cdots q_n$$

כש $p_1, \dots, p_m, q_1, \dots, q_n$ פולינומים אי פריקים, אזי $m = n$

ולכל $i, p_i = q_i$ (עד כדי כפל בקבוע ושינוי סדר של גורמים).

60 בעזרת פירוק יחיד, ניתן לנמק את הטענה הבאה: כל השורשים של הפולינום המינימלי של מטריצה A , הם הערכים העצמיים של A .

61 אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, אזי הפולינומים האי פריקים הם פולינומים לינאריים בלבד.

62 אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, אזי הפולינומים האי פריקים הם פולינומים לינאריים או פולינומים ריבועיים (ממעלה 2) בלבד.

63 אם $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$ או \mathbb{F} שדה סופי, אזי קיימים אינסוף פולינומים אי פריקים, ויש פולינומים אי פריקים ממעלה כלשהי.

64 יהיו A, B מטריצות ריבועיות. אזי:

- $\{\text{"ע"ע של } A \oplus B\} = \{\text{"ע"ע של } A\} \cup \{\text{"ע"ע של } B\}$
- $\det(A \oplus B) = \det(A) \cdot \det(B)$
- $p_{A \oplus B} = p_A \cdot p_B$
- $A \oplus B \sim B$

65 משפט ז'ורדן: תהי $A_{n \times n}$ מטריצה ריבועית. נניח שהפולינום האופייני $p_A(x)$ מתפרק למכפלה של גורמים לינאריים. אזי A דומה למטריצה J בצורה הבאה:

$$J = \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & J_{n_t}(\lambda_t) \end{pmatrix}$$

כשכל בלוק $J_{n_i}(\lambda_i)$ הוא תא ז'ורדן, כלומר:

$$J_{n_i}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}_{n_i \times n_i}$$

כאשר $\lambda_i, n_i \geq 1$ לא בהכרח שונים אחד מהשני.

בנוסף, המטריצה J היא יחידה (עד כדי סדר של הבלוקים).

ל- J קוראים צורת הז'ורדן של A .

66 אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי כך ש- $p_T(x)$ מתפרק למכפלה של גורמים לינאריים, אזי קיים בסיס של B כך שהמטריצה המייצגת $A = [T]_B$ היא מטריצת ז'ורדן J . קוראים ל- B בסיס מז'ורדן. J יחידה עד כדי שינוי סדר הבלוקים.

67 תהי J צורת הז'ורדן של מטריצה A . נניח ש- $p_A(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים. נסמן $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ כל הערכים העצמיים השונים של A . אזי:

- לכל A_i , הריבוי האלגברי שלו k_i שווה לסכום הגדלים של כל הבלוקים המכילים את λ_i .

- לכל A_i , הריבוי הגיאומטרי שלו m_i שווה למספר הבלוקים המכילים את λ_i .

- לפולינום המינימלי $m_A(x)$ מתקיים: $m_A(x) = (x - \lambda_1)^{d_1} \dots (x - \lambda_s)^{d_s}$ כש- d_i הינו הגודל המקסימלי של הבלוק המכיל את λ_i .

68 אם $A_{n \times n}$ ניתנת ללכסון, אזי בצורת ז'ורדן שלה יהיו בלוקים מגודל 1×1 .

69 $A_{n \times n}$ לכסינה אם ורק אם $m_A(x) = (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_s)$.

70 יהי $\mathbb{F} = \begin{cases} \mathbb{R} \\ \mathbb{C} \end{cases}$. יהי $V_{/\mathbb{F}}$ מרחב וקטורי.

נגדיר, לכל זוג וקטורים $v, w \in V$, את המכפלה הפנימית של v על w , $\langle v, w \rangle \in \mathbb{F}$, כך שמתקיימים התנאים הבאים:

1 1.5 לינאריות (Sesquilinear)

$$\langle \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2, w \rangle = \alpha_1 \langle v_1, w \rangle + \alpha_2 \langle v_2, w \rangle$$

$$\langle v, \beta_1 w_1 + \beta_2 w_2 \rangle = \overline{\beta_1} \langle v, w_1 \rangle + \overline{\beta_2} \langle v, w_2 \rangle$$

2 הרמטיות (Hermite)

$$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$$

3 אי שליליות (או חיוביות)

$$v = \vec{0} \Leftrightarrow \langle v, v \rangle = 0, \langle v, v \rangle \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

71 מכפלה פנימית סטנדרטית ב- \mathbb{F}^n : יהי $V = \mathbb{C}^n = \left\{ \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} \right\}_{\gamma_i \in \mathbb{C}}$

$$\langle v, w \rangle = \gamma_1 \overline{\gamma'_1} + \dots + \gamma_n \overline{\gamma'_n} \text{ אז } v = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} \gamma'_1 \\ \vdots \\ \gamma'_n \end{pmatrix} \text{ אם נגדיר:}$$

(.) היא מכפלה פנימית.

72 מכפלה פנימית סטנדרטית ב- $\mathbb{F}^{m \times n}$: יהי $V = M_{m \times n}(\mathbb{F})$

נגדיר: אם $A, B \in V$ אז $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t \cdot \bar{B})$.
(.) היא מכפלה פנימית.

73 תכונות של נורמה: יהי V מרחב מכפלה פנימית. אזי, נורמה $\|\cdot\|$ המושרית ממכפלה פנימית
(.) מקיימת:

- הומוגניות: לכל $v \in V$, לכל $\alpha \in \mathbb{F}$, $\|\alpha v\| = |\alpha| \cdot \|v\|$.
- אי שליליות: לכל $v \in V$, $0 \leq \|v\|$ - $v = \vec{0} \Leftrightarrow \|v\| = 0$.
- אי שוויון המשולש: לכל $v, w \in V$, $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$.

74 משפט פיתגורס: יהי V מרחב מכפלה פנימית.. יהיו $v, w \in V$. אם $\langle v, w \rangle = 0$, אז:

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$$

75 אי שוויון קושי בוניאקובסקי שוורץ: יהי V מרחב מכפלה פנימית. יהיו $v, w \in V$. אזי:

$$1. |\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

$$2. \langle v, w \rangle = \|v\| \cdot \|w\| \Leftrightarrow v, w \text{ תלויים לינארית.}$$

76 אי שוויון המשולש: יהי V מרחב מכפלה פנימית. לכל $v, w \in V$ מתקיים: $\|v + w\| \leq$

$$\|v\| + \|w\|$$

בנוסף, מתקיים שוויון אם ורק אם $w = \alpha \cdot v$, כאשר $\alpha \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ (תלות לינארית חיובית).

77 זהות פולארית ממשית: לכל $v, w \in V$:

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{2} \cdot (\|v + w\|^2 - \|v\|^2 - \|w\|^2)$$

78 זהות פולארית ממשית (צורה נוספת): לכל $v, w \in V$:

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{4} \cdot (\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2)$$

79 לכל $v, w \in V$ מתקיים: $\text{Re}(\langle v, w \rangle) = \text{Im}(\langle v, -iw \rangle)$.

80 זהות פולארית כללית: לכל $v, w \in V$:

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{2} \cdot (\|v + w\|^2 - \|v\|^2 - \|w\|^2) + \frac{1}{2} \cdot (\|v + i \cdot w\|^2 - \|v\|^2 - \|w\|^2)$$

81 כלל המקבילית: יהי $V_{\mathbb{F}}$ מרחב מכפלה פנימית ותהי (.) מכפלה פנימית מעל V .

תהי $\|\cdot\|$ הנורמה המושרית ע"י מכפלה פנימית זו. אזי לכל $v, w \in V$ מתקיים:

$$2 \cdot (\|v\|^2 + \|w\|^2) = \|v + w\|^2 + \|v - w\|^2$$

82 אם $\|\cdot\|$ מקיימת את כלל המקבילית, אזי $\|\cdot\|$ מושרית ממכפלה פנימית (.)

83 לכל $v \in V$: $v \perp 0$.

84 לכל $v, w \in V$: אם $v \perp w$, אז $w \perp v$.

85 לכל $v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$: אם $v \perp w$, אז $\alpha \cdot v \perp \beta \cdot w$.

86 אם $S \subset V$ קבוצה אורתוגונלית ו- $0 \notin S$, אז S בלתי תלויה לינארית.

87 כל קבוצה אורתונורמלית היא בלתי תלויה לינארית.

88 יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי B בסיס עבור V . תהי G_B מטריצת גראם יחסית לבסיס B .

$$\text{יהיו } v, w \in V \text{ : אם } [v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, [w]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \text{ : אזי :}$$

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \cdot \beta_j \cdot g_{ij} = [v]_B^t \cdot G_B \cdot [w]_B$$

89 יהי V מרחב מכפלה פנימית, יהיו B, \tilde{B} בסיסים עבור V . יהיו $G_B, G_{\tilde{B}}$ מטריצות גראם יחסית לבסיסים ו- P מטריצת המעבר בין הבסיסים. אזי : $G_{\tilde{B}} = P^t \cdot G_B \cdot P$.

90 יהי V מרחב מכפלה פנימית, יהיו B, \tilde{B} בסיסים עבור V . יהיו $G_B, G_{\tilde{B}}$ מטריצות גראם יחסית לבסיסים. אזי : אם G_B הפיכה, אזי גם $G_{\tilde{B}}$ הפיכה.

91 יהי $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. יהי V מרחב מכפלה פנימית, יהיו B, \tilde{B} בסיסים עבור V . יהיו $G_B, G_{\tilde{B}}$ מטריצות גראם יחסית לבסיסים. אם : $\det(G_B) > 0$. אזי : $\det(G_{\tilde{B}}) > 0$.

92 יהי V מרחב מכפלה פנימית. יהי $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס אורתונורמלי של V . יהי $v \in V$.

$$\forall 1 \leq i \leq n : \alpha_i = \langle v, v_i \rangle \text{ : אזי } [v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \text{ : נסמן את ההצגה של } v \text{ יחסית לבסיס } B$$

$$\langle v, v_i \rangle$$

93 משפט פיתגורס : יהי V מרחב מכפלה פנימית. יהי B בסיס אורתונורמלי. יהי $v \in V$. נסמן :

$$[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$\text{אזי : } \|v\|^2 = |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_n|^2$$

94 יהי V מרחב מכפלה פנימית. אם B, \tilde{B} בסיסים אורתוגונליים אזי מטריצת המעבר P היא מטריצה אוניטרית.

95 תהי P מטריצה אוניטרית. אזי :

- השורות של P מהוות בסיס אורתונורמלי של \mathbb{F}^n .
- העמודות של P מהוות בסיס אורתונורמלי של \mathbb{F}^n .

להיפך, אם אחד מהתנאים הנ"ל מתקיים, אזי P אוניטרית.

96 יהי V מרחב מכפלה פנימית. תהי $S \subset V$ קבוצה. אזי: $S^\perp \subset V$ הוא תת מרחב ווקטורי של V .

97 יהי V מרחב מכפלה פנימית. תהי $S \subset V$ קבוצה. אזי: $S^\perp = (\text{span}(S))^\perp$.

98 יהי V/\mathbb{F} מרחב מכפלה פנימית. יהי $W \subset V$ תת מרחב ווקטורי. אזי: $\pi_S: V \rightarrow W$ היא העתקה לינארית.

99 יהי V/\mathbb{F} מרחב מכפלה פנימית. יהי $W \subset V$ תת מרחב, $k = \dim W$. יהי

$$S = \{w_1, \dots, w_k\} \text{ בסיס אורתוגונלי של } W. \text{ יהי } v \in V. \text{ אזי: } \pi_S(v) = v \Leftrightarrow v \in W$$

100 יהי V מרחב מכפלה פנימית. יהי $v \in V$. אזי: $z = v - \pi_S(v) \in W^\perp$.

101 תהליך גראם שמידט. ראה הרצאה 18.

102 כל קבוצה אורתונורמלית ניתנת להשלמה עד לבסיס אורתונורמלי.

103 אי שוויון בסל: יהי V מרחב מכפלה פנימית. תהי $\{e_1, \dots, e_k\}$ קבוצה אורתונורמלית. יהי

$$v \in V. \text{ נסמן } \alpha_i = \langle v, e_i \rangle \quad (1 \leq i \leq k). \text{ אזי מתקיים אי-שוויון:}$$

$$\|v\|^2 \geq |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_k|^2. \text{ שוויון מתקיים אם ורק אם } v \in \text{span}\{e_1, \dots, e_k\}$$

104 יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $W \subset V$ תת מרחב. יהי $B = \{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ בסיס

$$V. \text{ יהי } W = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\} \text{ אזי: } W^\perp = \text{span}\{v_{k+1}, \dots, v_n\}$$

$$W = (W^\perp)^\perp \quad 105$$

106 משפט הפירוק הניצב: יהי V מרחב מכפלה פנימית. לכל $W \subset V$, מתקיים:

$$V = W \oplus W^\perp$$

107 יהי V מרחב מכפלה פנימית. יהי $v \in V$. ההיטל של v על W אינו תלוי בחירה של בסיס

אורתוגונלי של W .

108 תכונות של מרחק: יהי V מרחב מכפלה פנימית. אזי, מתקיים:

$$\bullet \text{ לכל } v, w \in V: d(v, w) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \text{ ו- } d(v, w) = 0 \Leftrightarrow v = w$$

$$\bullet \text{ לכל } v, w \in V: d(v, w) = d(w, v)$$

$$\bullet \text{ לכל } v, w, u \in V: d(v, u) \leq d(v, w) + d(w, u)$$

109 יהי V מרחב מכפלה פנימית. יהי $W \subset V$ תת מרחב ווקטורי. יהי $v \in V$. אזי:

$$d(v, \pi_W(v)) = \min\{d(v, w) : w \in W\}$$

110 יהיו V, W מרחבי מכפלה פנימית מעל אותו שדה \mathbb{F} . נסמן: $\dim V = n, \dim W = m$.

תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית. ההעתקה הצמודה ל- T , $T^*: W \rightarrow V$, מקיימת לכל

$$v \in V \text{ ולכל } w \in W: \langle T(v), w \rangle = \langle v, T^*(w) \rangle$$

111 $T^*: W \rightarrow V$ קיימת ויחידה.

112 תהי $T^*: W \rightarrow V$ העתקה הצמודה ל- $T: V \rightarrow W$.

יהיו: $B = \{v_1, \dots, v_n\}, B' = \{w_1, \dots, w_m\}$ בסיסים אורתונורמליים עבור V, W .

נסמן ב- A, A' את המטריצות המייצגות של T, T^* ביחס לבסיסים B, B' .

$$A' = A^* (= \bar{A}^t) \text{ אזי}$$

113 תכונות של ההעתקה הצמודה: יהי V מרחב מכפלה פנימית.

$$\bullet \text{ לכל } T, S: V \rightarrow V \text{ } (T + S)^* = T^* + S^*$$

$$\bullet \text{ לכל } T: V \rightarrow V \text{ ולכל } \alpha \in \mathbb{F} \text{ } (\alpha T)^* = \bar{\alpha} T^*$$

$$\bullet \text{ לכל } T: V \rightarrow V \text{ } (T^*)^* = T$$

$$\bullet \text{ לכל } T, S: V \rightarrow V \text{ } (T \cdot S)^* = S^* \cdot T^*$$

114 יהי V מרחב מכפלה פנימית. יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. נבחר בסיס אורתונורמלי B של

$$V, \text{ ונתבונן במטריצה המייצגת } A = [T]_B$$

$$\bullet T \text{ נורמלי} \Leftrightarrow A \text{ נורמלית.}$$

$$\bullet T \text{ אוניטרי} \Leftrightarrow A \text{ אוניטרית.}$$

$$\bullet T \text{ צמוד לעצמו} \Leftrightarrow A \text{ צמודה לעצמה.}$$

$$115 \text{ } T: V \rightarrow V \text{ אופרטור נורמלי} \Leftrightarrow \text{לכל } v \in V \text{ מתקיים } \|T(v)\| = \|T^*(v)\|$$

116 התכונות הבאות שקולות:

$$\bullet T: V \rightarrow V \text{ אופרטור אוניטרי.}$$

$$\bullet T \text{ שומר נורמה, כלומר: לכל } v \in V \text{ } \|T(v)\| = \|v\|$$

$$\bullet T \text{ שומר מרחק, כלומר: לכל } v, w \in V \text{ } d(T(v), T(w)) = d(v, w)$$

$$\bullet T \text{ שומר מכפלה פנימית, כלומר: לכל } v, w \in V \text{ } \langle T(v), T(w) \rangle = \langle v, w \rangle$$

$$117 \text{ יהי } \mathbb{F} = \mathbb{R}. \text{ אופרטור אוניטרי שומר זוויות, כלומר: } \widehat{T(v)}, \widehat{T(w)} = \widehat{v}, \widehat{w}$$

118 יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור נורמלי. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של T . יהי $v \in V$ ווקטור עצמי של T ,

$$\text{המתאים לערך העצמי } \lambda \text{ אזי: } T^*(v) = \bar{\lambda} \cdot v$$

119 אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור נורמלי, λ, μ ערכים עצמיים שונים של T , ווקטור עצמי של T

$$\text{המתאים לערך העצמי } \lambda, w \text{ ווקטור עצמי של } T \text{ המתאים לערך העצמי } \mu, \text{ אז: } v \perp w$$

120 אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור צמוד לעצמו, אזי כל הערכים העצמיים של T ממשיים.

121 אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, ואם T אופרטור סימטרי (אופרטור צמוד לעצמו), אזי $p_T(x)$ מתפרק לגורמים

לינאריים.

122 אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור אוניטרי, ואם λ ערך עצמי של T , אזי $|\lambda| = 1$.

123 אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, ואם T אופרטור אורתוגונלי (אופרטור אוניטרי), אזי $\lambda = \pm 1$.

124 שילוש אוניטרי לאופרטורים: כל אופרטור $T: V \rightarrow V$, כך ש- $p_T(x)$ מתפרק לגורמים

לינאריים, ניתן לשילוש אוניטרי, ז"א, קיים בסיס אורתונורמלי B של V כך ש- $A = [T]_B$

משולשת עליונה.

125 שילוש אוניטרי למטריצות: תהי A_0 מטריצה ריבועית כך ש- $p_{A_0}(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים. אזי קיימת מטריצה אוניטרית P כך ש- $A = P^{-1} \cdot A_0 \cdot P$ משולשת עליונה.

126 אם A מטריצה משולשת ונורמלית, אז A אלכסונית.

127 לכסון אוניטרי לאופרטורים: יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור נורמלי כך ש- $p_T(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים. אזי T ניתן לכסון אוניטרי, ז"א, קיים בסיס אורתונורמלי B של V , כך ש- $A = [T]_B$ היא מטריצה אלכסונית.

128 לכסון אוניטרי למטריצות: תהי A מטריצה נורמלית כך ש- $p_A(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים. אזי A ניתנת לכסון אוניטרי, ז"א, קיימת מטריצה אוניטרית P כך ש- $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$ מטריצה אלכסונית.

129 אם T ניתן לכסון אוניטרי, אזי $p_T(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים ו- T אופרטור נורמלי.

130 אם A ניתנת לכסון אוניטרי, אזי $p_A(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים ו- A מטריצה נורמלית.

131 יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור צמוד לעצמו. אזי T ניתן לכסון אורתוגונלי, ז"א, קיים בסיס אורתונורמלי B עבור V כך ש- $A = [T]_B$ מטריצה אלכסונית.

132 תהי A מטריצה סימטרית ממשית. אזי, A ניתנת לכסון אורתוגונלי, ז"א, קיימת מטריצה אורתוגונלית P כך ש- $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$ מטריצה אלכסונית.

133 אם A ניתנת לכסון אורתוגונלי, אזי A מטריצה סימטרית.

134 נניח ש- A מטריצה ממשית כך ש- $p_A(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים. אזי: A נורמלית אם ורק אם A סימטרית.

135 משפט הפירוק הספקטרלי: יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור נורמלי. נניח ש- $p_T(x)$ מתפרק לגורמים לינאריים.

יהיו ערכים עצמיים שונים של T . נסמן $V_i = V_{\lambda_i}$ המרחב העצמי של T

המתאים לערך העצמי λ_i .

אזי: $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_s$, ובנוסף $V_i \perp V_j$ לכל $1 \leq i \neq j \leq s$.

■