

אנליזה מתקדמת למורים, תרגיל 1

18 באוקטובר 2018

1. רשמו את המספרים הבאים בצורה $z = a + bi$, מצאו את $Im(z)$, $Re(z)$, \bar{z} , $|z|$ ומקמו את z על הצירים.

א. $(3 - 5i)^{-1}$

ב. $(\sqrt{5}i)^{-1}$

ג. 4^{-1}

ד. $\frac{3-3i}{4+3i}$

ה. $\frac{-5-i}{4-5i}$

הערה: לא להיבהל משברים ושורשים....

פתרון:

א. נקבל מהנוסחה $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ אצלנו:

$$z = (3 - 5i)^{-1} = \frac{\overline{3 - 5i}}{|3 - 5i|^2} = \frac{3 + 5i}{(\sqrt{3^2 + (-5)^2})^2} = \frac{3 + 5i}{(\sqrt{34})^2} = \frac{3}{34} + \frac{5}{34}i$$

ולכן: $Im(z) = \frac{5}{34}$, $Re(z) = \frac{3}{34}$, $\bar{z} = \frac{3}{34} - \frac{5}{34}i$, $|z| = \frac{1}{|z^{-1}|} = \frac{1}{\sqrt{34}}$

ב. כנל:

$$z = (\sqrt{5}i)^{-1} = \frac{\overline{\sqrt{5}i}}{|\sqrt{5}i|^2} = \frac{-\sqrt{5}i}{(\sqrt{\sqrt{5}^2})^2} = \frac{-\sqrt{5}i}{5} = -\frac{\sqrt{5}}{5}i$$

ולכן: $Im(z) = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $Re(z) = 0$, $\bar{z} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $|z| = \frac{1}{\sqrt{5}}$

ג. זהו המספר הממשי $\frac{1}{4}$, וזו גם ההצגה שלו כמרוכב. נקבל: $Im(z) = 0$, $Re(z) = \frac{1}{4}$, $\bar{z} = \frac{1}{4}$, $|z| = \frac{1}{4}$

ד. נכפיל בצמוד למכנה:

$$z = \frac{3 - 3i}{4 + 3i} = \frac{3 - 3i}{4 + 3i} \cdot \frac{4 - 3i}{4 - 3i} = \frac{12 - 9i - 12i - 9}{16 + 9} = \frac{3 - 21i}{25} = \frac{3}{25} - \frac{21}{25}i$$

ולכן: $Im(z) = \frac{21}{25}$, $Re(z) = \frac{3}{25}$, $\bar{z} = \frac{3}{25} + \frac{21}{25}i$, $|z| = \sqrt{(\frac{3}{25})^2 + (-\frac{21}{25})^2} = \sqrt{\frac{9+441}{625}} = \sqrt{\frac{450}{625}}$

ה. כנל:

$$z = \frac{-5 - i}{4 - 5i} = \frac{-5 - i}{4 - 5i} \cdot \frac{4 + 5i}{4 + 5i} = \frac{-20 - 25i - 4i + 5}{41} = \frac{-15 - 21i}{41} = -\frac{15}{41} - \frac{21}{41}i$$

ולכן: $Im(z) = -\frac{21}{41}, Re(z) = -\frac{15}{41}, \bar{z} = -\frac{15}{41} + \frac{21}{41}i, |z| = \sqrt{\left(-\frac{15}{41}\right)^2 + \left(-\frac{21}{41}\right)^2} = \sqrt{\frac{666}{1681}}$

2. חשבו את השורשים הבאים:

- א. \sqrt{i}
 ב. $\sqrt{7 + 24i}$
 ג. $\sqrt{-5 - 12i}$

פתרון:

א. נסמן את השורש ב $z = a + bi$, לכן $(a + bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2 = i$ ומכאן להשוואת מקדמים הנותנת לנו שתי משוואות בשני נעלמים:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 0 \\ 2ab = 1 \end{cases}$$

כלומר,

$$\begin{cases} a^2 = b^2 \\ ab = \frac{1}{2} \end{cases}$$

מהמשוואה השנייה נקבל $a^2 b^2 = \frac{1}{4}$ אבל הצצה במשוואה הראשונה תתן לנו $a^4 = \frac{1}{4}$ מה שאומר $a = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ ולכן (משוואה שניה) $b = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. כלומר, $z = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)$.
 ב. כאן נקבל שתי משוואות בשני נעלמים הבאות:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 7 \\ 2ab = 24 \end{cases}$$

מהמשוואה השנייה נקבל $b = \frac{12}{a}$, נציב במשוואה הראשונה ונקבל $a^2 - \left(\frac{12}{a}\right)^2 = 7$ פתרונות המשוואה הדו ריבועית הזו הם: $a^2 = 16$ או $a^2 = -9$ שלא אפשרי. לכן נקבל $a = \pm 4$, ובהתאמה $b = \pm 3$. בסה"כ: $z = \pm(4 + 3i)$.
 ג. בדומה נקבל:

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -5 \\ 2ab = -12 \end{cases}$$

מהמשוואה השנייה נקבל $b = \frac{-6}{a}$, נציב במשוואה הראשונה ונקבל $a^2 - \left(\frac{-6}{a}\right)^2 = -5$ פתרונות המשוואה הדו ריבועית הזו הם: $a^2 = 4$ או $a^2 = -9$ שלא אפשרי. לכן נקבל $a = \pm 2$, ובהתאמה, $a = 2 \Rightarrow b = -3, a = -2 \Rightarrow b = 3$ (מסמנים את זה $b = \mp 3$, קודם המינוס ואז הפלוס...). בסה"כ: $z = \pm(2 - 3i)$.

3. פתרו את המשוואות הבאות:

א. $z^2 + (4 + i)z + 5 + 5i = 0$

ב. $2z^2 - (12 + i)z + 17 = 0$

פתרון:

א. לפי נוסחת השורשים נקבל:

$$z_{1,2} = \frac{-4 - i \pm \sqrt{(4 + i)^2 - 4(5 + 5i)}}{2} = \frac{-4 - i \pm \sqrt{16 + 8i - 1 - 20 - 20i}}{2} = \frac{-4 - i \pm \sqrt{-5 - 12i}}{2}$$

כעת, לפי שאלה 2 סעיף ג נקבל $\sqrt{-5 - 12i} = \pm 2 - 3i$, ולכן:

$$z_{1,2} = \frac{-4 - i \pm (2 - 3i)}{2} \Rightarrow z_1 = -1 - 2i, z_2 = -3 + i$$

ב. לפי נוסחת השורשים נקבל:

$$z_{1,2} = \frac{12 + i \pm \sqrt{(12 + i)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 17}}{4} = \frac{12 + i \pm \sqrt{144 + 24i - 1 - 136}}{4} = \frac{12 + i \pm \sqrt{7 + 24i}}{4}$$

כעת, לפי שאלה 2 סעיף ב נקבל $\sqrt{7 + 24i} = \pm 4 + 3i$, ולכן:

$$z_{1,2} = \frac{12 + i \pm (4 + 3i)}{4} \Rightarrow z_1 = 4 + i, z_2 = 2 - \frac{1}{2}i$$

4. מצאו מספר מרוכב z המקיים: $|z| = 12, \operatorname{Im}(\bar{z}) = -9.5$.

פתרון:

מהנתונים נקבל: $b = 9.5, \sqrt{a^2 + 90.25} = 12 \Rightarrow a^2 = 144 - 90.25 = 53.75 \Rightarrow a = \pm\sqrt{53.75}$
 בקשו למצוא מספר אחד, לכן ניקח את השורש החיובי ונקבל:
 $z = 9.5 + \sqrt{53.75}i$

5. נניח שאנחנו מסמנים במישור המרוכב את כל המספרים z המקיימים $z + \bar{z} = 8$. מה

נקבל?

פתרון:

נקבל מהמשוואה ש $2\operatorname{Re}(z) = 8 \Rightarrow \operatorname{Re}(z) = 4$. כלומר, אם נחזור לסימון הרגיל $z = a + bi$, נקבל ש- $a = 4$, ו- b יכול להיות מה שאנחנו רוצים. נקבל את הישר האנכי לציר ה- $\operatorname{Re}(z)$ (הלא הוא ציר ה- x) בנקודה $(4, 0)$.

בהצלחה!