

1. הוכיחו כי הסדרות הבאות מתכנסות לגבולות הרשומים בצד ימין.

א.  $a_n = \frac{1}{n+27}$  0

$$|a_n - L| = \left| \frac{1}{n+27} - 0 \right| = \frac{1}{n+27} < \frac{1}{n}$$

יהי  $\epsilon > 0$ . נבחר  $N = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil$ . אם  $n > N$  אז  $n > \frac{1}{\epsilon}$  ומתקיים  $|a_n - L| < \frac{1}{n} < \epsilon$  כדרוש.

ב.  $a_n = \frac{n+3}{n+32}$  1

$$|a_n - L| = \left| \frac{n+3}{n+32} - 1 \right| = \frac{29}{n+32} < \frac{29}{n}$$

יהי  $\epsilon > 0$ . נבחר  $N = \left\lceil \frac{29}{\epsilon} \right\rceil$ . אם  $n > N$  אז  $n > \frac{29}{\epsilon}$  ומתקיים  $|a_n - L| < \frac{29}{n} < \epsilon$  כדרוש.

ג.  $a_n = \frac{4n^2-25}{n^2-16}$  4

$$|a_n - L| = \left| \frac{4n^2-25}{n^2-16} - 4 \right| = \frac{39}{n^2-16} < \frac{39}{n^2 - \frac{1}{2}n^2} = \frac{78}{n^2}$$

יהי  $\epsilon > 0$ . נבחר  $N = \left\lceil \sqrt{\frac{78}{\epsilon}} \right\rceil$ . אם  $n > N$  אז  $n > \sqrt{\frac{78}{\epsilon}}$  ומתקיים  $|a_n - L| < \frac{78}{n^2} < \epsilon$  כדרוש.

2. מיצאו את הגבולות של הסדרות הבאות והוכיחו כי הן מתכנסות אליהם, או הוכיחו כי הן אינן מתכנסות.

א.  $a_n = \frac{(-1)^n}{n^8}$

אינטואיטיבית "מנחשים" שהגבול הוא 0. נוכיח זאת:

$$|a_n - L| = \left| \frac{(-1)^n}{n^8} - 0 \right| = \frac{1}{n^8} < \frac{1}{n}$$

יהי  $\epsilon > 0$ . נבחר  $N = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil$ . אם  $n > N$  אז  $n > \frac{1}{\epsilon}$  ומתקיים  $|a_n - L| < \frac{1}{n} < \epsilon$  כדרוש.

ב.  $a_n = \frac{1+(-1)^n}{2^n+24}$

אינטואיטיבית "מנחשים" שהגבול הוא 0. נוכיח זאת:

$$|a_n - L| = \left| \frac{1+(-1)^n}{2^n+24} - 0 \right| = \frac{1+(-1)^n}{2^n+24} < \frac{2}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}} < \frac{1}{n}$$

(המעבר האחרון  $2^{n-1} \geq n$  לכל  $n$  טבעי באינדוקציה: בסיס  $n=1$ , אכן  $2^0 \geq 1$ . נניח כי מתקיים  $2^{k-1} \geq k$  ואז  $2^k = 2 \cdot 2^{k-1} \geq 2k \geq k+1$ .)

יהי  $\epsilon > 0$ . נבחר  $N = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil$ . אם  $n > N$  אז  $n > \frac{1}{\epsilon}$  ומתקיים  $|a_n - L| < \frac{1}{n} < \epsilon$  כדרוש.

ג.  $a_n = \frac{n^3-n^2+\sqrt{n}}{n^3+n^2-\sqrt{n}}$

אינטואיטיבית "מנחשים" שהגבול הוא 1. נוכיח זאת:

$$|a_n - L| = \left| \frac{n^3 - n^2 + \sqrt{n}}{n^3 + n^2 - \sqrt{n}} - 1 \right| = \left| \frac{-2n^2 + 2\sqrt{n}}{n^3 + n^2 - \sqrt{n}} \right| = \frac{2n^2 - 2\sqrt{n}}{n^3 + n^2 - \sqrt{n}} < \frac{2n^2}{n^3 - \sqrt{n}} < \frac{2n^2}{n^3 - \frac{1}{2}n^3} = \frac{4}{n}$$

הסבר למעבר הלפני אחרון:  $\frac{1}{2}n^3 > \sqrt{n}$  לכל  $n \geq 2$  כי  $n^6 > 4n$  לכל  $n \geq 2$  כי  $n(n^5 - 4) > 0$  לכל  $n \geq 2$ .

יהי  $\epsilon > 0$ . נבחר  $N = \left\lceil \frac{4}{\epsilon} \right\rceil$ . ואז אם  $n > N$  אז בפרט  $n \geq 2$  והחישוב לעיל תקף, וכיוון ש- $n > \frac{4}{\epsilon}$  אז

$$|a_n - L| = \frac{4}{n} < \frac{4}{4/\epsilon} = \epsilon$$

כדורש.

3. הוכיחו כי  $a_n = \frac{\sqrt{n}+n}{2n-7\sqrt{n}}$  לא מתכנסת ל- $\frac{1}{7}$ .

הגדרת  $a_n$  מתכנסת ל- $\frac{1}{7}$ : לכל  $\epsilon > 0$  יש  $N$  כך שלכל  $n > N$  טבעי מתקיים  $\left| \frac{\sqrt{n}+n}{2n-7\sqrt{n}} - \frac{1}{7} \right| < \epsilon$ .

ולכן הגדרת  $a_n$  איננה מתכנסת ל- $\frac{1}{7}$ : יש  $\epsilon > 0$  כך שלכל  $N$  יש  $n > N$  טבעי כך ש- $\left| \frac{\sqrt{n}+n}{2n-7\sqrt{n}} - \frac{1}{7} \right| \geq \epsilon$ .

מתקיים  $\frac{5}{14} = \frac{5n}{14n} \geq \frac{14\sqrt{n}+5n}{14n-49\sqrt{n}} = \left| \frac{\sqrt{n}+n}{2n-7\sqrt{n}} - \frac{1}{7} \right| = \left| \frac{14\sqrt{n}+5n}{14n-49\sqrt{n}} \right|$ . המעבר השני נכון רק ל- $n \geq 13$ .

לכן נוכל לבחור  $\epsilon = \frac{5}{14}$  ואז לכל  $n \geq 13$  טבעי מתקיים  $\left| \frac{\sqrt{n}+n}{2n-7\sqrt{n}} - \frac{1}{7} \right| \geq \epsilon$ . כלומר, בהינתן  $N$ , נבחר  $n = \max(N + 1, 13)$ .

הערה: היה ניתן לפתור תרגיל זה גם כך: להוכיח ישירות שהסדרה מתכנסת ל- $\frac{1}{2}$  ולכן גבולה איננו  $\frac{1}{7}$  מיחידות הגבול.

4. הוכיחו כי  $a_n = \frac{1+(-1)^n}{2}$  לא מתכנסת.

נניח בשלילה כי  $a_n \rightarrow L$  באשר  $L$  מס' ממשי.

אפשרות ראשונה:  $L \geq \frac{1}{2}$ .

$a_n \rightarrow L$  לכן עבור  $\epsilon = \frac{1}{2}$  מתקיים כי קיים  $N$  כך שלכל  $n > N$  מתקיים  $|a_n - L| < \frac{1}{2}$  כלומר  $\left| \frac{1+(-1)^n}{2} - L \right| < \frac{1}{2}$  ובפרט עבור  $n > N$  אי-זוגי מתקיים

$$|0 - L| < \frac{1}{2}$$

כלומר  $L < \frac{1}{2}$  סתירה.

אפשרות שניה:  $L < \frac{1}{2}$ .

באופן דומה  $a_n \rightarrow L$  לכן עבור  $\epsilon = \frac{1}{2}$  מתקיים כי קיים  $N$  כך שלכל  $n > N$  מתקיים  $|a_n - L| < \frac{1}{2}$  כלומר  $\left| \frac{1+(-1)^n}{2} - L \right| < \frac{1}{2}$  ובפרט עבור  $n > N$  זוגי מתקיים

$$|1 - L| < \frac{1}{2}$$

כלומר בפרט  $1 - L < \frac{1}{2}$  כלומר  $L > \frac{1}{2}$ , סתירה.

5. להזכירכם, הגדרנו: סדרה ממשית  $(a_n)$  מתכנסת למספר הממשי  $L$  אם:

לכל  $\epsilon > 0$  ממשי קיים  $N$  טבעי כך שלכל  $n > N$  טבעי המקיים  $|a_n - L| < \epsilon$ .

א. הראו כי אם בהגדרה לעיל משנים את  $n > N$  ל- $n \geq N$  מתקבלת הגדרה שקולה.

**הגדרה שקולה כלומר: כל סדרה שמתכנסת לפי ההגדרה עם  $n \geq N$  ולא יותר גבול, ולהיפך.**

נניח כי  $(a_n)$  מקיימת את  $|a_n - L| < \epsilon$   $\forall n > N_1 \in \mathbb{N} \exists N_1 > 0 \forall \epsilon > 0$  ורוצים להראות שהיא מקיימת את

$$|a_n - L| < \epsilon \quad \forall n \geq N_2 \in \mathbb{N} \exists N_2 > 0 \forall \epsilon > 0$$

יהי  $\epsilon > 0$ . לפי ההנחה יש  $N_1$  טבעי כך שלכל  $n > N_1$  טבעי המקיים  $|a_n - L| < \epsilon$ .

נבחר  $N_2 = N_1 + 1$ . ואז אם  $n \geq N_2$  כלומר  $n \geq N_1 + 1$  אז  $n > N_1$  ולכן לפי ההנחה  $|a_n - L| < \epsilon$  כדורש.

בכיוון ההפוך אפשר לבחור את אותו ה- $N$  כי אם משהו מתקיים לכל  $n \geq N$  אז הוא מתקיים גם לכל  $n > N$ .

ב. באופן דומה, הראו כי אם משנים את  $|a_n - L| < \epsilon$  בהגדרה לעיל ל- $|a_n - L| \leq \epsilon$ , מתקבלת הגדרה שקולה.

נניח כי  $(a_n)$  מקיימת את  $|a_n - L| \leq \epsilon_1 \forall n > N_1 \exists N_1 \in \mathbb{N} \forall \epsilon_1 > 0$  ורוצים להראות שהיא מקיימת את

$$\forall \epsilon_2 > 0 \exists N_2 \in \mathbb{N} \forall n > N_2 |a_n - L| < \epsilon_2$$

יהי  $\epsilon_2 > 0$ . נבחר  $\epsilon_1 = \frac{\epsilon_2}{2}$ . אז לפי ההנחה יש  $N_1$  כך שלכל  $n > N_1$  מתקיים  $|a_n - L| \leq \epsilon_1 = \frac{\epsilon_2}{2} < \epsilon_2$ . נבחר  $N_2 = N_1$  ואז אכן אם  $n > N_2$  אז  $|a_n - L| < \epsilon_2$  ומתקיים  $|a_n - L| < \epsilon_2$  כדרוש.

בכיוון ההפוך אפשר לבחור את אותו ה- $N$  כי אם  $|a_n - L| < \epsilon$  אז גם  $|a_n - L| \leq \epsilon$ .

ג. הראו שההגדרה לעיל איננה שקולה להגדרה בה משנים את  $\epsilon > 0$  ל- $\epsilon \geq 0$ .

אף סדרה איננה מקיימת את ההגדרה עם  $\epsilon \geq 0$ , כי עבור  $\epsilon = 0$  מקבלים שצריך להתקיים  $|a_n - L| < 0$ , מה שאף פעם לא מתקיים.

מצד שני ראינו שכן יש סדרות שמקיימות את הגדרת התכנסות, למשל  $a_n = \frac{1}{n}$ .

6. תהי  $a_n$  סדרה המתכנסת למספר  $\pi$ . נגדיר סדרה חדשה  $b_n$  שזוהי לסדרה המקורית  $a_n$  בכל אחד מהאינדקסים מלבד האינדקס 314, ובאינדקס זה מתקיים  $b_{314} = 2a_{314}$ . הוכיחו כי  $b_n$  מתכנסת גם היא למספר  $\pi$ .

נתון כי  $a_n \rightarrow \pi$  כלומר לכל  $\epsilon > 0$  יש  $N$  כך שלכל  $n > N$  טבעי מתקיים  $|a_n - \pi| < \epsilon$ .

צ"ל כי  $b_n \rightarrow \pi$  כלומר לכל  $\epsilon > 0$  יש  $N$  כך שלכל  $n > N$  מתקיים  $|b_n - \pi| < \epsilon$ .

יהי  $\epsilon > 0$ . כיוון ש- $a_n \rightarrow \pi$  יש  $N'$  כך שלכל  $n > N'$  טבעי מתקיים  $|a_n - \pi| < \epsilon$ .

נבחר  $N = \max(N', 314)$ . ואז אם  $n > N$  אז בפרט  $n > 314$  כלומר  $b_n = a_n$ . כמו כן  $n > N'$  ולכן  $|a_n - \pi| < \epsilon$  כלומר  $|b_n - \pi| < \epsilon$ , מש"ל.

הערה: תרגיל זה הוא מקרה פרטי של הטענה הכללית שאם מוחקים/מוסיפים/משנים מספר סופי של איברי סדרה, הדבר לא משפיע על התכנסות הסדרה.

7. היעזרו באי-שוויון המשולש:

א. תהי  $(a_n)$  סדרה המתכנסת ל-0. נגדיר  $b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$ . הוכיחו כי  $(b_n)$  מתכנסת ל-0.

ב. יהיו  $a, b, c$  מספרים ממשיים,  $\epsilon, \zeta$  ממשיים חיוביים. הוכיחו כי אם  $|a - b| < \epsilon$ , וגם  $|b - c| < \zeta$  אז  $|a - c| < \epsilon + \zeta$ .

(סעיף א' נחכה עד לאחר סדרות קושי – אז יהיה בידנו פתרון פשוט יותר.)

סעיף ב': לפי אי-שוויון המשולש  $|a - c| = |a - b + b - c| \leq |a - b| + |b - c| = \epsilon + \zeta$

דרך אחרת לראות זאת:  $|a - b| < \epsilon$  שקול ל- $-\epsilon < a - b < \epsilon$ , וכן  $|b - c| < \zeta$  שקול ל- $-\zeta < b - c < \zeta$ . נחבר את שניהם יחדיו ונקבל

$$-\epsilon - \zeta < a - c < \epsilon + \zeta$$

8. הוכיחו/הפריכו:

א. אם  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = L$  אז הסדרה  $(a_n)$  מתכנסת.

הפרכה: נסתכל על הסדרה  $a_n = (-1)^n$  שכידוע איננה מתכנסת. מתקיים  $|a_n| = 1 \rightarrow 1$ .

ב. אם  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  אז  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |L|$ .

הוכחה: יהי  $\epsilon > 0$ . צ"ל שיש  $N$  כך שלכל  $n > N$  מתקיים  $||a_n| - |L|| < \epsilon$ .

כיוון ש- $a_n \rightarrow L$  יש  $N$  כך שלכל  $n > N$  מתקיים  $|a_n - L| < \epsilon$  ואז אכן  $||a_n| - |L|| \leq |a_n - L| < \epsilon$

באשר השתמשנו בכיוון ההפוך של אי-שוויון המשולש:  $|a - b| \geq ||a| - |b||$  לכל  $a, b$  ממשיים - קל להוכיח ע"י חלוקה למקרים. (למשל כאשר  $a$

חיובי ו- $b$  שלילי אז צד שמאל הוא  $a - b$  וצד ימין הוא  $a + b$ , וכך הלאה.)

ג. אם  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$  אז קיים  $N$  טבעי כך שלכל  $n > N$  מתקיים  $a_n > 0$ .

הפרכה: נסתכל על הסדרה  $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ . מתקיים  $a_n \rightarrow 0$ , וכן  $|a_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ , אך לא קיים  $N$  טבעי כך שלכל  $n > N$  מתקיים  $a_n > 0$  כי עבור כל  $n$

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n} = \frac{-1}{n} < 0$$

אי-זוגי מתקיים