

## אנליזה מודרנית 1 - תרגול 9

### השתנות חסומה:

תזכורת: אם  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $P | [a, b]$  (P חלוקה של  $[a, b]$ ) ע"י הנקודות

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

מגדירים את ההשתנות של f ביחס ל-P ע"י  $v(f, P) = \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})|$

$$T_a^b[f] = \sup \{v(f, P) : P | [a, b]\}$$

הגדרה: אם  $T_a^b[f] < \infty$  אומרים ש-f בעלת השתנות חסומה בקטע. מרחב כל הפונקציות

$$BV([a, b]) = \{f : T_a^b[f] < \infty\}$$

הגדרה: אומרים שחלוקה Q היא עידון של החלוקה P, אם Q מתקבלת מ-P ע"י הוספת מספר סופי של נקודות.

1. תרגיל: תהיינה  $P, P^* | [a, b]$  חלוקות ו-P\* מעדנת את P. הוכיחו כי  $v(f, P) \leq v(f, P^*)$

פתרון: תחילה, נניח כי P\* התקבלה מ-P ע"י הוספת נקודה אחת בלבד,  $x^*$  הנמצאת בקטע  $x_{r-1} < x^* < x_r$ . אם כך:

$$\begin{aligned} v(f, P) &= |f(x_1) - f(x_0)| + |f(x_2) - f(x_1)| + \dots + |f(x_r) - f(x_{r-1})| + \dots + |f(x_n) - f(x_{n-1})| \\ &= |f(x_1) - f(x_0)| + \dots + |f(x_r) - f(x^*) + f(x^*) - f(x_{r-1})| + \dots + |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq \\ &\leq |f(x_1) - f(x_0)| + \dots + |f(x_r) - f(x^*)| + |f(x^*) - f(x_{r-1})| + \dots + |f(x_n) - f(x_{n-1})| = v(f, P^*) \end{aligned}$$

ואם P\* התקבלה ע"י הוספת N נקודות, חוזרים על ההוכחה שלעיל N פעמים.

2. תרגיל: תהי  $P: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  חלוקה, הוכיחו כי  $T_a^b[f] = \sum_{k=1}^n T_{x_{k-1}}^{x_k}[f]$

פתרון: נניח כי מדובר על חלוקה בת שני קטעים (אחרת, כמו מקודם אפשר לחזור על ההוכחה)

$$T_a^b[f] = T_a^c[f] + T_c^b[f] \quad P: a = x_0 < x_1 = c < x_2 = b$$

$\leq$ : תהי  $P | [a, b]$ , נעדן את P ע"י הוספת הנקודה c (אם אינה נמצאת):

$v(f, P) \leq v(f, P \cup \{c\}) = |f(x_1) - f(x_0)| + |f(x_2) - f(x_1)| + \dots + |f(c) - f(x_{m-1})|$   
 $+ |f(x_{m+1}) - f(c)| + \dots + |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq \sup\{v(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, c]\} + \sup\{v(f, P) : P \in \mathcal{P}[c, b]\}$   
 הראינו כי כל איברי הקבוצה  $\{v(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\}$  חסומים מלעיל ע"י  $T_a^c[f] + T_c^b[f]$  ולכן גם  $\sup\{v(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} \leq T_a^c[f] + T_c^b[f]$  וזה הא"ש המבוקש.

$\geq$  : יהי  $\varepsilon > 0$ , ע"פ האפיון של  $\sup$  יש חלוקות  $P_1 \in \mathcal{P}[a, c], P_2 \in \mathcal{P}[c, b]$  המקיימות

$$v(f, P_2) \geq T_c^b[f] - \varepsilon/2, v(f, P_1) \geq T_a^c[f] - \varepsilon/2$$

נחבר את הא"ש לקבל  $v(f, P_1) + v(f, P_2) \geq T_a^c[f] + T_c^b[f] - \varepsilon$ .  $P_1 \cup P_2$  היא חלוקה של  $[a, b]$  וקל לראות כי

$$v(f, P_1 \cup P_2) = v(f, P_1) + v(f, P_2)$$

נשאיף  $\varepsilon \rightarrow 0$  לקבל התוצאה.  $\sup\{v(f, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} \geq v(f, P_1 \cup P_2) \geq T_a^c[f] + T_c^b[f] - \varepsilon$

3. תרגיל: תהי  $D: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציית דיריכלה,  $D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} = I_{\mathbb{Q}}(x)$ , הוכיחו שבכל

$$T_a^b[D] = \infty \text{ (קטע עם אורך חיובי!) מתקיים}$$

פתרון: יהי  $N$  טבעי. על סמך צפיפות הרציונליים והאי-רציונליים בקטע, נוכל לבנות חלוקה  $P_N: a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$  "מתחלפת" – זאת אומרת שהנקודות הן מתחלפות בין רציונליות לאי-רציונליות לסירוגין (לפחות בלי הקצוות, שם אין לדעת). נחשב את ההשתנות:

$$v(D, P_N) = \sum_{k=1}^N |D(x_k) - D(x_{k-1})| \geq \sum_{k=2}^{N-1} |D(x_k) - D(x_{k-1})| = \sum_{k=2}^{N-1} 1 = N - 2$$

אם כך הקבוצה  $\{v(D, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\}$  מכילה מספרים גדולים כרצוננו ולכן  $\sup\{v(D, P) : P \in \mathcal{P}[a, b]\} = \infty$ .

4. תרגיל: הוכיחו כי הפונקציה  $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$  אינה בעלת השתנות חסומה

בקטע  $[0, 1]$ .

פתרון: צריכים לתפוס את התנודות של הפונקציה.  $\sin \frac{1}{x}$  מחזירה +1 בנקודות  $x_k = \frac{2}{\pi + 4\pi k}$

ומחזירה -1 בנקודות  $x_k = \frac{2}{3\pi + 4\pi k}$ . לכל  $N$  נגדיר שוב חלוקה "מתחלפת"

$$P_N: \frac{2}{\pi} > \frac{2}{3\pi} > \dots > \frac{2}{\pi + 4\pi k} > \frac{2}{3\pi + 4\pi k} > \dots > \frac{2}{\pi + 4\pi N} > \frac{2}{3\pi + 4\pi N}$$

מקבלים

$$\begin{aligned} v(f, P_N) &\geq \left| \frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{2}{3\pi} \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \right| + \dots + \left| \frac{2}{\pi + 4\pi k} \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) - \frac{2}{3\pi + 4\pi k} \sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right) \right| + \\ &\dots + \left| \frac{2}{\pi + 4\pi N} \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi N\right) - \frac{2}{3\pi + 4\pi N} \sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2\pi N\right) \right| = \\ &= \left| \frac{2}{\pi} + \frac{2}{3\pi} \right| + \dots + \left| \frac{2}{\pi + 4\pi k} + \frac{2}{3\pi + 4\pi k} \right| + \dots + \left| \frac{2}{\pi + 4\pi N} + \frac{2}{3\pi + 4\pi N} \right| = \\ &= \sum_{k=0}^N \left( \frac{2}{\pi + 4\pi k} + \frac{2}{3\pi + 4\pi k} \right) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{2k+1}{(4k+1)(4k+3)} \end{aligned}$$

וכאשר  $N \rightarrow \infty$  מקבלים טור מתבדר. מכאן ה- $\sup$  הוא אינסופי.

5. תרגיל: תהי  $f \in BV([a, b])$

א. הוכיחו כי לכל  $x_0 \in (a, b)$  קיימים הגבולות החד צדדיים  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$  (מכאן שלפונקציה בעלת השתנות חסומה אין אי רציפות מהסוג השני).

ב. הוכיחו כי קבוצת נקודות אי הרציפות של  $f$  היא בת מנייה (וכמובן ממידת לבג 0).

פתרון: ע"פ "משפט הפירוק של ז'ורדן" ניתן לרשום  $f = g - h$  כאשר  $g, h$  עולות.

א. ידוע שלפונקציות עולות קיימים גבולות חד-צדדיים, ולכן המספרים  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} g(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} h(x)$ ,  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} h(x)$  קיימים כולם. מאריתמטיקה של גבולות מקבלים כי גם הגבולות החד-צדדיים של  $f$  קיימים בכל נקודה.

ב. ידוע מאינפי' שקבוצת נקודות אי הרציפות של פונקציה מונוטונית היא בת מנייה. קבוצת נקודות אי הרציפות של  $f$  מוכלת באיחוד של נקודות אי הרציפות של  $g, h$  ולכן היא בת מנייה.

6. תרגיל: תהי  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  הוכיחו כי התנאים הבאים שקולים:

1.  $f$  רציפה בהחלט,  $f'(x) \in \{0, 1\}$  כב"מ (dm) ו- $f(0) = 0$

2. קיימת קבוצה  $A \subseteq [0, 1]$ , מדידה לבג כך ש- $f(x) = m(A \cap (0, x))$

פתרון:

2  $\Leftarrow$  1 נגדיר  $A := \{x \in [0, 1] : f'(x) = 1\}$ . בגלל ש- $f$  רציפה היא מדידה, ולכן גם הנגזרת שלה  $f'$  מדידה (תרגול שעבר) ומכאן שהקבוצה  $A$  מדידה. עכשיו בגלל ש- $f$  רציפה בהחלט:

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f' dm = \int_0^x f' dm = \int_0^x I_A dm = \int_0^x I_{A \cap (0, x)} dm = m(A \cap (0, x))$$

$f(x) = m(A \cap (0, x)) = \int_0^x I_A dm$   $1 \leq 2$  ומכאן  $f$  רציפה בהחלט (הכללת לבג חלק א')

ע"פ הכללת לבג  $f'(x) = I_A(x)$  כב"מ, ולכן  $f'(x) \in \{0, 1\}$  כב"מ. ופשוט לראות כי  $f(0) = 0$ .

7. הראו כי עבור אינטגרל רימן, באופן כללי, משפט ההתכנסות הנשלטת ומשפט ההתכנסות המונוטונית אינם תקפים.

פתרון: נסתכל על הקטע  $[0, 1]$  ונסדר את  $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$  בסדרה  $\{q_n\}$ . נגדיר את הפונקציות הבאות:

$$f_n = \begin{cases} 1 & x \in \{q_1, q_2, \dots, q_n\} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

ברור כי נקודתית, הסדרה  $f_n$  מתכנסת לפונקציה דריכלה. כמו כן, עפ"י משפט שלמדנו פונקציה הינה אינטגרבילית רימן אם"מ היא רציפה כב"מ. ולכן  $f_n$  אינטגרבילית לכל  $n$ . אבל פונקציה דריכלה איננה רציפה באף נקודה ולכן איננה אינטגרבילית רימן. מכאן שקיימת סדרה של פונקציות אינטגרביליות רימן המתכנסות מונוטונית לפונקציה חסומה אך הפונקציה איננה אינטגרבילית.