

תזכורת

יהיו V, W מרחבי מכפלה פנימית.

תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה לינארית, ו- $T^*: W \rightarrow V$ ההעתקה הצמודה ל- T .

יהי B בסיס אורתונורמלי עבור V ו- \tilde{B} בסיס אורתונורמלי עבור W .

תהי A המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיסים B, \tilde{B} , ו- A' המטריצה המייצגת של T^* ביחס לבסיסים \tilde{B}, B .

אזי מתקיים: $A' = A^*$, כש- $A^* = \overline{A^t}$.

תכונות של ההעתקה הצמודה T^*

$$1. (T + S)^* = T^* + S^*$$

$$2. (\alpha T)^* = \bar{\alpha} T^*$$

$$3. (T^*)^* = T$$

$$4. (T \cdot S)^* = S^* \cdot T^*$$

הוכחה

נבחר בסיסים אורתונורמליים ונשתמש בעובדה ש- $A' = A^*$. נתרגם את 1 – 4 ללשון של מטריצות. (תרגיל – לבדוק!)

אופרטורים מיוחדים במרחבי מכפלה פנימית

נתבונן באופרטורים לינאריים $T: V \rightarrow V$ כאשר V מרחב מכפלה פנימי. נבחר בסיס אורתונורמלי B של V , ונתבונן במטריצה המייצגת $A = [T]_B$.

הגדרה

יהי אופרטור $T: V \rightarrow V$.

T אופרטור נורמלי אם $T \cdot T^* = T^* \cdot T$,

T אופרטור אוניטרי אם $T \cdot T^* = T^* \cdot T = I$ (מעל \mathbb{R} נקרא גם אופרטור אורתוגונלי)

T אופרטור צמוד לעצמו אם $T^* = T$ (מעל \mathbb{R} נקרא גם אופרטור סימטרי)

הגדרה

תהי מטריצה A .

A מטריצה נורמלית אם $A \cdot A^* = A^* \cdot A$,

A מטריצה אוניטרית אם $A \cdot A^* = A^* \cdot A = I$ (מעל \mathbb{R} נקראת גם מטריצה אורתוגונלית)

A מטריצה צמודה לעצמה או מטריצה הרמטית אם $A^* = A$ (מעל \mathbb{R} נקרא גם מטריצה סימטרית)

משפט

T נורמלי $\Leftrightarrow A$ נורמלית.

T אוניטרי $\Leftrightarrow A$ אוניטרית.

T צמוד לעצמו $\Leftrightarrow A$ הרמטית.

הוכחה

מידית מהתכונה $A' = A^*$.

תכונות של אופרטורים נורמליים

משפט

אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור נורמלי, אזי לכל $v \in V$ מתקיים $\|T(v)\| = \|T^*(v)\|$. להפך, אם לכל $v \in V$ מתקיים $\|T(v)\| = \|T^*(v)\|$ אזי T נורמלי.

הוכחה

נניח ש- T נורמלי.

$$\|T(v)\|^2 = \langle T(v), T(v) \rangle = \langle v, T^*(T(v)) \rangle$$

$$\begin{aligned} \|T^*(v)\|^2 &= \langle T^*(v), T^*(v) \rangle = \langle v, (T^*)^*(T^*(v)) \rangle = \langle v, T(T^*(v)) \rangle \\ \|T(v)\| &= \|T^*(v)\| \text{ : לכן } T(T^*(v)) = T^*(T(v)) \end{aligned}$$

ניח ש- $\|T(v)\| = \|T^*(v)\|$ לכל $v \in V$. נוכיח: $\langle T(v), T(w) \rangle = \langle T^*(v), T^*(w) \rangle$.
לכל זוגות $v, w \in V$.
ניעזר בזהות הפולרית.

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle &= \frac{1}{2} \left(\|v+w\|^2 - \|v\|^2 - \|w\|^2 \right) + \frac{1}{2}i \left(\|v+iw\|^2 - \|v\|^2 - \|w\|^2 \right) \text{ : (תזכורת)} \\ \langle T(v), T(w) \rangle &= \frac{1}{2} \left(\|T(v)+T(w)\|^2 - \|T(v)\|^2 - \|T(w)\|^2 \right) + \\ &+ \frac{1}{2}i \left(\|T(v)+iT(w)\|^2 - \|T(v)\|^2 - \|T(w)\|^2 \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\|T(v+w)\|^2 - \|T(v)\|^2 - \|T(w)\|^2 \right) + \\ &+ \frac{1}{2}i \left(\|T(v+iw)\|^2 - \|T(v)\|^2 - \|T(w)\|^2 \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\|T^*(v+w)\|^2 - \|T^*(v)\|^2 - \|T^*(w)\|^2 \right) + \\ &+ \frac{1}{2}i \left(\|T^*(v+iw)\|^2 - \|T^*(v)\|^2 - \|T^*(w)\|^2 \right) \end{aligned}$$

מהשוויון $\langle T(v), T(w) \rangle = \langle T^*(v), T^*(w) \rangle$ נקבל את התוצאה הנדרשת.

$$\langle v, T^*(T(w)) \rangle = \langle v, T(T^*(w)) \rangle$$

לכל $v, w \in V$, לכן:

$$\langle v, \overbrace{T^*(T(w)) - T(T^*(w))}^u \rangle = 0$$

לכל $v, w \in V$.

ניקח $u = v$, ונקבל $\langle u, u \rangle = 0$: לכן $u = \vec{0}$.

לכן: $T^*(T(w)) = T(T^*(w))$ לכל $w \in V$.

לכן, $T^* \cdot T = T \cdot T^*$ כלומר, T נורמלי.

■

משפט

התכונות הבאות שקולות:

(א) T אוניטרי

(ב) T שומר נורמה, ז"א $\|T(v)\| = \|v\|$ לכל $v \in V$.

ג) T שומר מרחקים, ז"א $d(T(v), T(w)) = d(v, w)$ לכל $v, w \in V$.
 ד) T שומר מכפלה פנימית ז"א $\langle T(v), T(w) \rangle = \langle v, w \rangle$ לכל $v, w \in V$.

הוכחה

$$\boxed{\text{א} \Leftarrow \text{ד}}$$

נניח ש- $T \cdot T^* = T^* \cdot T = I$ אוניטרי אז

$$\langle T(v), T(w) \rangle = \langle v, T^*(T(w)) \rangle = \langle v, Id(w) \rangle = \langle v, w \rangle$$

$$\boxed{\text{ב} \Leftarrow \text{ד}}$$

נניח $\langle T(v), T(w) \rangle = \langle v, w \rangle$

$w = v$ נקבל $\langle T(v), T(v) \rangle = \langle v, v \rangle$

$$\|T(v)\|^2 = \|v\|^2$$

$$\|T(v)\| = \|v\|$$

$$\boxed{\text{ב} \Leftarrow \text{ג}}$$

נניח $\|T(v)\| = \|v\|$

$$d(T(v), T(w)) = \|T(v) - T(w)\| = \|T(v - w)\| = \|v - w\| = d(v, w)$$

$$\boxed{\text{ב} \Leftarrow \text{ג}}$$

נניח $d(T(v), T(w)) = d(v, w)$

ניקח $w = \vec{0}$

$$d(T(v), \vec{0}) = d(v, \vec{0})$$

$$\|T(v) - \vec{0}\| = \|v - \vec{0}\|$$

$$\|T(v)\| = \|v\|$$

$$\boxed{\text{ב} \Leftarrow \text{ד}}$$

נניח $\|T(v)\| = \|v\|$

צריך להוכיח $\langle T(v), T(w) \rangle = \langle v, w \rangle$

נעזר בזהות הפולרית:

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{2} (\|v + w\|^2 - \|v\|^2 - \|w\|^2) + \frac{1}{2} i (\|v + iw\|^2 - \|v\|^2 - \|w\|^2)$$

$$\langle T(v), T(w) \rangle = \frac{1}{2} (\|T(v) + T(w)\|^2 - \|T(v)\|^2 - \|T(w)\|^2) +$$

$$+ \frac{1}{2} i (\|T(v) + iT(w)\|^2 - \|T(v)\|^2 - \|T(w)\|^2) = \langle v, w \rangle$$

$$\boxed{\alpha \leftarrow \tau}$$

$$\langle T(v), T(w) \rangle = \langle v, w \rangle : \text{נתון}$$

$$\langle v, T^*T(w) \rangle = \langle v, w \rangle$$

$$\langle v, \overbrace{T \cdot T^*(w)}^u - w \rangle = 0$$

$$\langle v, u \rangle = 0$$

ניקח $u = v$, ונקבל $\langle u, u \rangle = 0$, לכן $u = 0$.

$T \cdot T^* = I$ לכן $w \in V$ לכל $T \cdot T^*(w) = w$

■

משפט

נניח $\mathbb{F} = \mathbb{R}$.

אופרטור לינארי שומר זוויות, זאת אומרת $\widehat{\langle T(v), T(w) \rangle} = \widehat{\langle v, w \rangle}$.

הוכחה

$$\cos(\widehat{\langle T(v), T(w) \rangle}) = \frac{\langle T(v), T(w) \rangle}{\|T(v)\| \cdot \|T(w)\|} = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} = \cos(\widehat{\langle v, w \rangle})$$

הערה

שמירת זווית אינה מאפיינת אופרטורים אוניטריים. קיימים אופרטורים שומרים זוויות שאינם אופרטורים אוניטריים.

דוגמה

$$T(v) = 2v$$

$$\cos(\widehat{\langle T(v), T(w) \rangle}) = \frac{\langle T(v), T(w) \rangle}{\|T(v)\| \cdot \|T(w)\|} = \frac{\langle 2v, 2w \rangle}{\|2v\| \cdot \|2w\|} = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|} = \cos(\widehat{\langle v, w \rangle})$$

אבל $\|T(v)\| = \|2v\| = 2\|v\|$ לכן T אינו אופרטור אוניטרי.

משפט

יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור נורמלי. יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ עייע של T . יהי $v \in V$ וייע המתאים ל- λ .

$$T^*(v) = \bar{\lambda}v, \text{ אזי}$$

הוכחה

נוכיח את זה למטריצות. נוכיח ש- $A^*v = \bar{\lambda}v$.

$$0 = \|Av - \lambda v\| = \|(A - \lambda I)v\|$$

$A - \lambda I \leftarrow$ נורמלי גם A נורמלי.

לכן:

$$0 = \|(A - \lambda I)^* v\| = \|(A^* - \lambda I)(v)\| = \|A^*(v) - \bar{\lambda}v\|$$

$$A^*v = \bar{\lambda}v$$

■