

תרגיל בית 10

1. נניח H הינו מרחב הילברט עם בסיס בן מנייה ונניח כי $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ כאשר $n \rightarrow \infty$ וגם $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ לכל $y \in H$ כאשר $n \rightarrow \infty$. הוכיחו כי $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ כאשר $n \rightarrow \infty$.

2. נניח a_n הינה סדרה של מספרים ממשיים כך ש $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n < \infty$ עבור כל $\{b_n\}$ כך ש

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 < \infty . \text{ הוכיחו כי } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty .$$

3. תהי ν מידה סופית. הוכיחו כי ν הינה רציפה בהחלט ביחס למידה μ אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם $\mu(A) < \delta$ אזי $\nu(A) < \varepsilon$ (הדרכה: לצד השני, הניחו בשלילה כי לכל $\delta = 2^{-k}$ קיימת A_n כך ש $\mu(A_n) < 2^{-k}$ אבל $\nu(A_n) > \varepsilon$. הסתכלו על הקבוצה $E_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$. מה המידה של $\mu(E_k)$ כאשר $k \rightarrow \infty$? מה המידה של $\nu(E_k)$ כאשר $k \rightarrow \infty$?

4. יהיו μ ו ν שתי מידות חיוביות כך ש $\mu \ll \nu$ ו $\mu = g d\nu$. הראו כי אם f פונקציה אינטגרבלית ביחס למידה μ אזי היא אינטגרבלית ביחס למידה ν ומתקיים

$$\int f g d\nu = \int f d\mu$$

5. נניח כי μ ו ν הינן מידות חיוביות סיגמא סופיות כך ש ν הינה רציפה בהחלט ביחס ל μ . תהי

$$\rho = \mu + \nu . \text{ שימו לב כי } \mu \ll \rho \text{ וגם כי } \nu \ll \rho . \text{ הוכיחו כי אם } f = \frac{d\mu}{d\rho} \text{ ו } g = \frac{d\nu}{d\rho} \text{ אזי}$$

א. $f > 0$ כב"מ μ .

ב. $f + g = 1$ כב"מ ρ .

ג. $d\nu = \frac{g}{f} d\mu$.