

## אינפי 4 - תרגיל 2

תאריך הגשה: 3-4 אפריל 2017

**תרגיל 1.** חשבו את האינטגרלים הבאים:

$$1. \int_{\gamma} (2x + y + z) dl \quad \text{כאשר } \gamma(t) = (t + 1, t + 2, 3) \quad \text{עבור } 0 \leq t \leq 2$$

$$2. \int_{\Gamma} \sqrt{x^2 + y^2} dl \quad \text{כאשר } \Gamma = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4x\}$$

$$3. \int_{\Gamma} xyz dl \quad \text{כאשר } \Gamma = \{(x, y, z) \mid x = t, y = \frac{1}{3}\sqrt{8t^3}, z = \frac{1}{2}t^2, 0 \leq t \leq 1\}$$

**תרגיל 2.** נתון קפיץ על ידי  $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 3t)$  כך שצפיפות המסה בנקודה  $(x, y, z)$  היא  $x^2 + y^2 + z^2$ . חשבו את מסת הקפיץ אם נתון שקצה אחד שלו נמצא ב  $(1, 0, 0)$  ואורכו  $\sqrt{360}\pi$ .

**תרגיל 3.** תהי  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  מסילה בעלת אורך עם תמונה  $\Gamma$ . תהי  $f$  פונקציה רציפה המוגדרת על  $\Gamma$  עבורה האינטגרל  $\int_{\gamma} f dl$  קיים.

1. הוכיחו כי  $f$  חסומה.

2. יהי  $M$  חסם של  $f$ . הוכיחו שמתקיים  $|\int_{\gamma} f dl| \leq ML(\gamma)$ .  
הדרכה (לשני הסעיפים): עבדו עם ההגדרה של  $\int_{\gamma} f dl$  כגבול של סכומי רימן.

**תרגיל 4.** תהי  $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\beta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$  שתי עקומות. נתון כי קיימת  $\phi : [a, b] \rightarrow [c, d]$  כך ש  $\beta \phi = \alpha$  ונתון כי  $\phi$  היא ח"ע ועל, מונוטונית עולה, רציפה וההופכית  $\phi$  גם רציפה (אבל לא נתון כי  $\phi$  גזירה! ולכן לא ברור אם  $\alpha$  ו  $\beta$  שקולות). הוכיחו כי לכל  $f$  המוגדרת על תמונת  $\alpha, \beta$  מתקיים כי האינטגרל  $\int_{\alpha} f dl$  קיים אם ורק אם האינטגרל  $\int_{\beta} f dl$  קיים ובמקרה זה

$$\int_{\alpha} f dl = \int_{\beta} f dl$$

**הדרכה:** הראו כי לכל חלוקה  $P : a = p_0 < p_1 < \dots < p_n = b$  של קטע  $[a, b]$  וסדרה של נקודות  $\{t_i\}_{i=1}^n$  שמקיימות  $t_i \in [p_{i-1}, p_i]$  וסדרה של נקודות  $P' : c = p'_0 < p'_1 < \dots < p'_n = d$  וסדרה של נקודות  $t'_i \in [p'_{i-1}, p'_i]$

$$\|\alpha(p_i) - \alpha(p_{i-1})\| = \|\beta(p'_i) - \beta(p'_{i-1})\|$$

$$\alpha(t_i) = \beta(t'_i)$$

לכל  $1 \leq i \leq n$

**תרגיל 5.** תהי  $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\beta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$  שתי עקומות חלקות וח"ע בעלות אותה תמונה  $\Gamma$  כך שמתקיים

$$\alpha(a) = \beta(c)$$

$$\alpha(b) = \beta(d)$$

1. הוכיחו כי  $\phi = \beta^{-1} \circ \alpha : [a, b] \rightarrow [c, d]$  היא פונקציה חח"ע ועל.

2. הראו כי  $\Gamma$  קומפקטית.

3. הראו ש  $\beta^{-1}$  רציפה. (הדרכה: תהי  $U \subseteq [c, d]$  קבוצה סגורה. הראו ש  $\beta(U)$  סגורה - מומלץ להשתמש בסדרות. הסיקו שתמונה הפוכה של קבוצה סגורה תחת  $\beta^{-1}$  היא גם סגורה והסיקו ש  $\beta^{-1}$  רציפה).

4. הראו ש  $\beta^{-1} \circ \alpha$  רציפה ומונוטונית עולה ממש.

5. הסיקו מהתרגיל הקודם כי לכל פונקציה  $f$  המוגדרת על  $\Gamma$  מתקיים כי  $\int_{\alpha} f d\mathbf{l}$  קיין אם ורק אם האינטגרל  $\int_{\beta} f d\mathbf{l}$  קיים ובמקרה זה

$$\int_{\alpha} f d\mathbf{l} = \int_{\beta} f d\mathbf{l}$$

הערה: אינטואיטיבית, תרגיל זה מראה שאין תלות בפרמטריזציה שאנחנו בוחרים בשביל לייצג עקומה כלשהיא הנתונה כקבוצה.