

## פתרון תרגיל בית 2 בתורת החבורות

88-218 סמסטר א' תשע"ח

### שאלות חימום

שאלות החימום הן שאלות קלות יותר בדרך כלל, אבל כדאי מאוד לוודא שיודעים איך לפתור אותן, אפילו בעל פה.

1. בחרו כמה סעיפים וענו עבור המערכת האלגברית המופיעה בו:

האם היא אגודה?

האם היא מונואיד? אם כן, מי הוא איבר היחידה?

האם היא חבורה?

האם הפעולה היא חילופית?

(א)  $(\mathbb{N}, *)$ , המספרים הטבעיים עם הפעולה  $a * b = a + b + 2$ .

(ב)  $(\mathbb{Q} \setminus \{-1\}, *)$ , המספרים הרציונלים בלי  $-1$  עם הפעולה  $a * b = a + b + ab$ .

(ג)  $(\mathbb{N}, \max)$ , המספרים הטבעיים עם הפעולה של בחירת המקסימום.

(ד)  $(\mathbb{Z} \setminus 3\mathbb{Z}, \cdot)$ , המספרים השלמים פרט לכפולות של 3 עם פעולת הכפל הרגילה.

(ה) תהי  $X$  קבוצה.  $(P(X), \Delta)$ , כאשר  $P(X)$  היא קבוצת החזקה של  $X$ . הפעולה היא ההפרש הסימטרי המוגדר לכל

$$A, B \in P(X) \text{ לפי } A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

(ו) הקבוצה הבאה ביחס לחיבור מטריצות

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 > 0 \right\}$$

(ז)  $(A, \cdot)$ , הקבוצה מן הסעיף הקודם ביחס לכפל מטריצות.

### פתרון:

לא נציין מפורשות בכל סעיף שאם מבנה אלגברי הוא חבורה, אז הוא גם מונואיד, ולכן גם אגודה. ולהפך, אם הוא לא אגודה, אז ודאי שהוא גם לא מונואיד וכו'.

(א) מבנה זה הוא אגודה כי ישנה סגירות והפעולה קיבוצית, שכן מתקיים  $(a * b) * c = a + b + c + 4 = a * (b * c)$ . הפעולה

חילופית עקב חילופיות החיבור הרגיל בטבעיים. לא מדובר במונואיד כי אילו היה איבר יחידה, אזי הוא היה  $-2$  שאינו מספר טבעי.

(ב) מבנה זה הוא חבורה חילופית (אבלית). הפעולה קיבוצית כי

$$\begin{aligned} (a * b) * c &= (a + b + ab) * c = a + b + ab + c + ac + bc + abc \\ &= a + b + c + bc + ab + ac + abc = a * (b + c + bc) = a * (b * c) \end{aligned}$$

כאשר אנחנו נעזרים בחילופיות של החיבור בשיויון בין השורות. בעזרת החילופיות גם של כפל רגיל נראה שהפעולה חילופית:

$$a * b = a + b + ab = b + a + ba = b * a$$

לכל  $a \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$  מתקיים  $a * 0 = a + 0 + a \cdot 0 = a$  ולכן איבר היחידה הוא  $e = 0$ . נמצא שכל איבר הפיך כי  $a * b = a + b + ab = 0$  אם ורק אם  $b(1+a) = -a$ , כלומר  $b = \frac{-a}{1+a}$  והקבוצה לא כוללת את  $-1$ , ולכן אין חלוקה באפס ובנוסף ברור כי  $b \neq -1$  (אחרת  $-1 = \frac{-a}{1+a}$  ונסיק  $1 = 0$ ).

(ג) הסגירות של הפעולה ברורה. הפעולה קיבוצית כי

$$\max\{\max\{a, b\}, c\} = \max\{a, b, c\} = \max\{a, \max\{b, c\}\}$$

איבר היחידה הוא 1 כי לכל  $n \in \mathbb{N}$  מתקיים  $\max\{n, 1\} = \max\{1, n\} = n$ . אין הפיך לאף איבר פרט ל-1, ולכן מדובר במונואיד. הפעולה חילופית.

(ד) הפעולה סגורה כי מכפלה של מספרים שלמים שאינם כפולה של 3 היא מספר שלם שאינו כפולה של 3. הפעולה קיבוצית כי פעולת הכפל הרגילה של מספרים היא קיבוצית. קיים איבר יחידה, שהוא  $1 \in \mathbb{Z} \setminus 3\mathbb{Z}$ . אין הפיך לכמעט כל האיברים, למשל לאיבר 2 אין הפיך. לכן מבנה זה הוא מונואיד.

(ה) מבנה זה הוא חבורה. סגירות נובעת מכך שאם  $A, B \in P(X)$ , אז גם  $A \Delta B$  היא תת קבוצה של  $X$ . קיבוציות הפעולה ידועה ממתמטיקה בדידה. איבר היחידה הוא הקבוצה הריקה. קל לבדוק שכל איבר הוא ההופכי של עצמו. הפעולה (כפי ששמה רומז) היא חילופית.

(ו) הפעולה לא סגורה, למשל

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin A$$

ולכן לא מדובר באגודה. הפעולה חילופית.

(ז) מבנה זה הוא חבורה. הסגירות לא מיידיית, שכן לא מספיק להראות שמכפלת שני איברים הוא מטריצה, אלא מטריצה ששייכת ל- $A$ :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & bc + ad \\ -(bc + ad) & ac - bd \end{pmatrix}$$

ולשים לב כי  $(ac - bd)^2 + (bc + ad)^2$  שהיא הדטרמיננטה של המכפלה היא מכפלה של דטרמיננטות חיוביות, ולכן חיובית בעצמה. הפעולה קיבוצית כי כפל מטריצות הוא קיבוצי. איבר היחידה הוא מטריצת היחידה  $I_2$ . כל מטריצה במבנה זה היא הפיכה מפני שמתקיים  $a^2 + b^2 > 0$  שהיא הדטרמיננטה, כשהאיבר ההופכי הוא

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

ודאו למה מטריצה זו שייכת למבנה. בדיקה ישירה תראה שהפעולה חילופית.

2. תהי  $A$  קבוצה. והי  $f \in \text{Fun}(A) = A^A = \{f : A \rightarrow A\}$  איבר במונואיד. הוכיחו:

(א) קיים ל- $f$  הוכפי מימין אמ"מ  $f$  על.

(ב) קיים ל- $f$  הוכפי משמאל אמ"מ  $f$  חח"ע.

**פתרון:**

(א) נניח ש- $f$  על. צריך להוכיח כי קיים ל- $f$  הוכפי מימין, כלומר איבר  $g \in A^A$  כך ש  $f \circ g = \text{id}_A$ .

יהי  $x \in A$ , על, ולכן קיים  $x'$  כך ש  $f(x') = x$ . נגדיר  $g(x) := x'$ . ואכן מתקיים:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x') = x$$

כלומר  $f \circ g = \text{id}_A$  כדרוש.

**כעת נניח שיש ל- $f$  הופכי מימין**, כלומר קיימת  $g$  כך ש  $f \circ g = \text{id}_A$ .

יהי  $x \in A$ , נסמן  $x' = g(x)$ . אזי, לפי הנתון:

$$f(x') = f(g(x)) = (f \circ g)(x) = x$$

לכן  $x$  קיים מקור, כלומר  $f$  על.

(ב) **נניח ש- $f$  חח"ע**. נקבע  $a \in A$  קבוע. ויהי  $x \in A$ . נתבונן בקבוצה  $f^{-1}(\{x\})$ . נשים לב כי  $|f^{-1}(\{x\})| \leq 1$  כיוון ש  $f$

חח"ע. אם  $f^{-1}(\{x\}) = \emptyset$ , נגדיר  $g(x) = a$ .

אחרת,  $f^{-1}(\{x\}) = \{y\}$ , ונגדיר  $g(x) = y$ .

מתקיים:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$$

כלומר  $g$  הוא ההופכי משמאל של  $f$ .

**כעת נניח שיש ל- $f$  הופכי משמאל**. יהיו  $x, y \in A$ , ונניח  $f(x) = f(y)$ .

$$x = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(f(y)) = (g \circ f)(y) = y$$

כלומר  $f$  חח"ע.

3. תהי  $G$  חבורה, ו- $a \in G$  איבר. הוכיחו:

(א) אם  $aa = a$ , אזי  $a = e$ .

(ב) אם יש  $b \in G$  כך ש- $ab = e$  אזי  $ba = e$  ו- $b = a^{-1}$ .

**פתרון:**

(א) מפני ש- $a \in G$  איבר בחבורה, אזי קיים לו הופכי  $a^{-1}$ . נכפול את שני אגפי המשוואה ב- $a^{-1}$  מימין (אותה תוצאה

תתקבל בכפל משמאל) ונקבל

$$a = aaa^{-1} = aa^{-1} = e$$

(ב) בחבורה כל איבר הוא הפיך. אם  $ab = e$ , אזי  $b$  הופכי ימני של  $a$ . אם  $c$  הוא הופכי שמאלי כלשהו של  $a$ , אזי

$$b = e \cdot b = (ca)b = c(ab) = c \cdot e = c$$

כלומר  $c = b$ . לכן  $b = a^{-1}$  הוא ההופכי של  $a$  ו- $ba = e$ .

4. תהי  $S$  אגודה ו- $a \in S$  איבר. נגדיר את פעולת החזקה לפי  $a^1 = a$ , ולכל  $n > 1$  נגדיר  $a^{n+1} = a^n \cdot a$ . הוכיחו כי מתקיים:

(א)  $a^n a^m = a^{n+m}$  לכל  $n, m \in \mathbb{N}$ .

(ב)  $(a^n)^m = a^{nm}$  לכל  $n, m \in \mathbb{N}$ .

(ג) נניח כי  $S$  היא חבורה עם איבר יחידה  $e$  ונרחיב את ההגדרה לכל חזקה שלמה לפי  $a^0 = e$  ו- $a^{-n} = (a^{-1})^n$ . הוכיחו כי  $(a_1 \dots a_k)^{-1} = a_k^{-1} \dots a_1^{-1}$  לכל  $a_1, \dots, a_k \in S$ . הסיקו כי  $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$  לכל  $n \in \mathbb{Z}$ .

**פתרון:**

$$(א) \text{ לפי ההגדרה } a^n a^m = \underbrace{(a \dots a)}_n \underbrace{(a \dots a)}_m = \underbrace{a \dots a}_{m+n} = a^{n+m}$$

$$(ב) \text{ באופן דומה } (a^n)^m = \underbrace{a^n a^n \dots a^n}_m = \underbrace{(a \dots a)}_n \dots \underbrace{(a \dots a)}_n = \underbrace{a \dots a}_{mn} = a^{mn}$$

(ג) כפל משמאל וכפל מימין של  $a_1 \dots a_k$  ב- $a_k^{-1} \dots a_1^{-1}$  הוא איבר היחידה:

$$a_k^{-1} \dots a_2^{-1} a_1^{-1} a_1 a_2 \dots a_k = a_k^{-1} \dots a_2^{-1} a_2 \dots a_k = \dots = a_k^{-1} a_k = e$$

$$a_1 \dots a_{k-1} a_k a_k^{-1} a_{k-1}^{-1} \dots a_1^{-1} = a_1 \dots a_{k-1} a_{k-1}^{-1} \dots a_1^{-1} = \dots = a_1^{-1} a_1 = e$$

אם נבחר  $k = n$  ו- $a_1 = a_2 = \dots = a_k = a$ , אז נקבל  $(a^n)^{-1} = a^{-n}$ .

## שאלות רגילות

1. תהינה  $(G, *)$  ו- $(H, \bullet)$  חבורות. נגדיר על המכפלה הקרטזית  $G \times H$  פעולה "רכיב-רכיב":

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 * g_2, h_1 \bullet h_2)$$

לכל  $g_1, g_2 \in G, h_1, h_2 \in H$ .

- (א) הוכיחו כי  $G \times H$  עם הפעולה לעיל היא חבורה. היא נקראת המכפלה הישרה (החיצונית) של  $G$  ו- $H$ .  
 (ב) הוכיחו או הפריכו: החבורה  $G \times H$  אבלית אם ורק אם  $G$  ו- $H$  אבליות.  
 (ג) תהינה  $G', H'$  תת-חבורות של  $G, H$  בהתאמה. הוכיחו או הפריכו:  $G' \times H'$  היא תת-חבורה של  $G \times H$ .

**פתרון:**

(א) ההוכחה לכל אחד מהתנאים בהגדרת חבורה (קיבוציות הפעולה, קיום איבר יחידה וקיום הפיך לכל איבר) נובעת מהתנאי המקביל שמתקיים עבור  $G$  ו- $H$  שהן חבורות.

יהיו  $(g_1, h_1), (g_2, h_2), (g_3, h_3) \in G \times H$ . אזי

$$\begin{aligned} ((g_1, h_1)(g_2, h_2))(g_3, h_3) &= (g_1 g_2, h_1 h_2)(g_3, h_3) = (g_1 g_2 g_3, h_1 h_2 h_3) \\ &= (g_1, h_1)(g_2 g_3, h_2 h_3) = (g_1, h_1)((g_2, h_2)(g_3, h_3)) \end{aligned}$$

כי הפעולות ב- $G$  וב- $H$  הן קיבוציות. איבר היחידה הוא  $(e_G, e_H)$ , ואכן

$$(g, h)(e_G, e_H) = (ge_G, he_H) = (g, h) = (e_G g, e_H h) = (e_G, e_H)(g, h)$$

לכל איבר  $(g, h) \in G \times H$ . ההופכי שלו הוא  $(g^{-1}, h^{-1})$  מפני ש-

$$(g, h)(g^{-1}, h^{-1}) = (gg^{-1}, hh^{-1}) = (e_G, e_H) = (g^{-1}g, h^{-1}h) = (g^{-1}, h^{-1})(g, h)$$

(ב) הוכחה. אם  $G \times H$  אבלית, אזי לכל  $(g_1, h_1), (g_2, h_2) \in G \times H$  מתקיים

$$(g_1 g_2, h_1 h_2) = (g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_2, h_2)(g_1, h_1) = (g_2 g_1, h_2 h_1)$$

ובפרט לכל  $g_1, g_2 \in G$  ולכל  $h_1, h_2 \in H$  מתקיים  $g_1 g_2 = g_2 g_1$  ו- $h_1 h_2 = h_2 h_1$ , שזו בדיוק ההגדרה לכך ש- $G, H$  אבליות.

אם  $G, H$  אבליות, אז נחזור על הטיעון בכיוון השני.

(ג) הוכחה. מפני ש- $G' \leq G'$ , אז  $e_G \in G'$ , ובאופן דומה מפני ש- $H' \leq H'$ , אז  $e_H \in H'$ . לכן  $(e_G, e_H) \in G' \times H'$  ולכן  $G' \times H'$  לא ריקה.

יש סגירות לפעולה כי  $G'$  ו- $H'$  סגורות לפעולה: יהיו  $(g_1, h_1), (g_2, h_2) \in G' \times H'$ , אזי

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1g_2, h_1h_2) \in G' \times H'$$

שהרי  $g_1g_2 \in G'$  ו- $h_1h_2 \in H'$ . כך גם לגבי סגירות להופכי, אם  $(g, h) \in G' \times H'$ , אז  $g^{-1} \in G'$  ו- $h^{-1} \in H'$ , ולכן  $(g^{-1}, h^{-1}) \in G' \times H'$  שהוא האיבר ההופכי של  $(g, h)$ .

2. מצאו את לוח כפל של חבורה עם שישה איברים המכילה איברים  $e, \tau, \sigma$  המקיימים  $\sigma^3 = e, \tau^2 = e, \sigma\tau \neq \tau\sigma$ .

בתור התחלה, שימו לב שכל איבר ניתן לרשום באופן מייצג בצורה  $\tau^i\sigma^j$  עבור  $i = 0, 1$  ו- $j = 0, 1, 2$ . בעזרת הנתונים אפשר למצוא את טבלת הכפל המלאה של החבורה.

**פתרון:**

בפתרון יש לפרט את השלבים, הטבלה הסופית היא:

|                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $\tau\sigma^2$ | $\tau\sigma$   | $\tau$         | $\sigma^2$     | $\sigma$       | $e$            | $\cdot$        |
| $\tau\sigma^2$ | $\tau\sigma$   | $\tau$         | $\sigma^2$     | $\sigma$       | $e$            | $e$            |
| $\tau\sigma$   | $\tau$         | $\tau\sigma^2$ | $e$            | $\sigma^2$     | $\sigma$       | $\sigma$       |
| $\tau$         | $\tau\sigma^2$ | $\tau\sigma$   | $\sigma$       | $e$            | $\sigma^2$     | $\sigma^2$     |
| $\sigma^2$     | $\sigma$       | $e$            | $\tau\sigma^2$ | $\tau\sigma$   | $\tau$         | $\tau$         |
| $\sigma$       | $e$            | $\sigma^2$     | $\tau$         | $\tau\sigma^2$ | $\tau\sigma$   | $\tau\sigma$   |
| $e$            | $\sigma^2$     | $\sigma$       | $\tau\sigma$   | $\tau$         | $\tau\sigma^2$ | $\tau\sigma^2$ |

3. תהי  $G$  חבורה. הוכיחו כי  $G$  אבליית אם ורק אם לכל  $a, b \in G$  מתקיים  $(ab)^2 = a^2b^2$ .

**פתרון:**

לכל זוג איברים  $a, b \in G$  מתקיים  $(ab)^2 = abab = aabb = a^2b^2$ . נכפיל משמאל ב- $a^{-1}$  ומימין ב- $b^{-1}$  ונקבל

$$a^{-1}ababb^{-1} = ba = ab = a^{-1}aabb^{-1}$$

כלומר  $ba = ab$ .

4. תהי  $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  חבורה אבליית סופית. נסמן  $b = a_1a_2 \dots a_n$ . הוכיחו כי  $b^2 = e$ . אתגר: בעזרת השאלה הבאה מצאו קריטריון מתי  $b = e$ .

**פתרון:**

כיוון ש- $G$  אבליית, לא משנה סדר המכפלה של האיברים ב- $b^2$ . נשים לב שב- $b^2$  כל איבר בחבורה מופיע פעמיים. נסדר את המכפלות כך של איבר יהיה ליד ההופכי שלו  $b^2 = a_1a_1^{-1}a_2a_2^{-1} \dots a_na_n^{-1}$ . אז קל לראות כי  $b^2 = e$ .

5. תהי  $G$  חבורה. נסמן  $m_2 = |\{x \in G : x^2 = e\}|$ .

(א) הראו שבכל חבורה סופית מתקיים:  $m_2 \equiv |G| \pmod{2}$ .

(ב) הראו שבכל חבורה עם מספר זוגי של איברים קיים איבר  $x \neq e$  המקיים  $x^2 = e$ .

הדרכה לסעיף א: העזרו ביחס השקילות הבא על  $G$ :  $x \sim y \iff x = y \vee xy = e$ . מה הגודל של כל מחלקת שקילות?

**פתרון:**

(א) נסתכל על יחס השקילות שבהדרכה. כלומר כל איבר שקול לעצמו ולהופכי שלו.

נשים לב שאיבר הוא ההופכי של עצמו אם ורק אם הוא מקיים  $x^2 = e$ . לכן מחלקת שקילות של  $x$  היא או מגודל 1 (אם  $x^2 = e$ ) או מגודל 2 (אם  $x^2 \neq e$ ).

מכיוון שקבוצה היא איחוד מחלקות השקילות שלה:  $|G| = m_2 + 2r$  כאשר  $r$  הוא מספר המחלקות מגודל 2. מכאן ש- $|G| \equiv m_2 \pmod{2}$ .

(ב) לפי הסעיף הקודם, מכיוון ש- $|G|$  זוגי, כך גם  $m_2$ .

תמיד מתקיים  $m_2 \geq 1$  כי  $e$  מקיים את הדרישה ש- $e^2 = e$ . לכן אצלנו נסיק כי  $m_2 \geq 2$ , ולכן חייב להיות עוד איבר חוץ מהיחידה המקיים את התכונה.

6. הוכיחו שאם באגודה  $S$  יש פתרון לכל משוואה מן הצורה  $ax = b$  או  $xa = b$ , אז זו חבורה. (רמז: לפי ההנחה יש איבר  $e \in S$  (התלוי ב- $a$ ) כך ש- $ae = a$ . לכל  $c \in S$  קיים  $x$  כך ש- $cx = a$ , ואז  $ce = xae = xa = c$ , ולכן  $e$  הוא יחידה מימין. באופן דומה יש יחידה משמאל).

#### פתרון:

נשתמש ברמז, ולפי הנחה יש פתרון למשוואה  $ax = a$ . נניח כי  $e$  הוא פתרון (התלוי ב- $a$ ). נשים לב כי לכל  $c \in S$  מתקיים כי קיים פתרון  $x$  למשוואה  $xa = c$ . לכן

$$ce = (xa)e = x(ae) = xa = c$$

וקיבלנו כי  $e$  הוא יחידה מימין. באופן דומה יש פתרון  $e'$  למשוואה  $xa = a$ . לכל  $c \in S$  קיים פתרון  $x$  למשוואה  $ax = c$ , ומתקיים כי

$$e'c = e'(ax) = (e'a)x = ax = c$$

ולכן  $e'$  יחידה משמאל. אבל אם קיימים איברי יחידה מימין ומשמאל, אז יש איבר יחידה יחיד. נסמן אותו ב- $e$ . לפי הנתון יש פתרון למשוואות  $cx = e$  ו- $xc = e$ , כלומר קיים הופכי משמאל ומימין לכל איבר  $c \in S$ . לכן כל איבר  $c \in S$  הוא הפיך.

בהצלחה!