

פתרונות תרגיל 9

. א. הוצאה נעשית עם החזרה.

I	1	2	3
P(X=I)	1/2	1/4	1/4

S	1	4	9
P(X^2=S)	1/2	1/4	1/4

או X,Y בלתי תלויים ושווי התפלגות.

$$E[X] = E[Y] = 1 * \frac{1}{2} + 2 * \frac{1}{4} + 3 * \frac{1}{4} = 1.75$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] = 2 * 1.75 = 3.5$$

$$E[X^2] = 1 * \frac{1}{2} + 4 * \frac{1}{4} + 9 * \frac{1}{4} = 3.75 = E[Y^2]$$

$$Var[X] = Var[Y] = E[X^2] - (E[X])^2 = 3.75 - 1.75^2 = 0.6875$$

$$Var[X + Y] = Var[X] + Var[Y] = 2 * 0.6875 = 1.375$$

. ב. הוצאה בלי החזרה.

X\Y	1	2	3	P(Y)
1	1/6	1/6	1/6	1/2
2	1/6	0	1/12	1/4
3	1/6	1/12	0	1/4
P(X)	1/2	1/4	1/4	1

S	2	3	4	5	6
P(X+Y=S)	1/6	1/3	1/3	1/6	0

$$E[X] = E[Y] = 1 * \frac{1}{2} + 2 * \frac{1}{4} + 3 * \frac{1}{4} = 1.75$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] = 2 * 1.75 = 3.5$$

$$E[X^2] = 1 * \frac{1}{2} + 4 * \frac{1}{4} + 9 * \frac{1}{4} = 3.75 = E[Y^2]$$

$$Var[X] = Var[Y] = E[X^2] - (E[X])^2 = 3.75 - 1.75^2 = 0.6875$$

$$E[X + Y] = 2 * \frac{1}{6} + 3 * \frac{1}{3} + 4 * \frac{1}{3} + 5 * \frac{1}{6} = 3.5$$

$$E[(X + Y)^2] = 4 * \frac{1}{6} + 9 * \frac{1}{3} + 16 * \frac{1}{3} + 25 * \frac{1}{6} = 13\frac{1}{6}$$

$$Var(X + Y) = E[(X + Y)^2] - (E[X + Y])^2 = 0.9166$$

.2 אם X, Y בלתי תלויים ומשתנים מקריים אינדיktוריים (שיימו לב - אם הם לא הוו $0,1$, אז התנאי $P(X = i, Y = j) = P(X = i)^* P(Y = j)$ - גנ"ל לא היה שקול לאי תלות), אז אי תלות משמעה -

$$\begin{aligned}
 P(X = 0, Y = 0) &= P(X = 0)^* P(Y = 0) \Leftrightarrow a = (a + b)^* (a + c) = \\
 a^2 + ab + ac + bc &\Leftrightarrow a^* (1 - a - b - c) = bc \Leftrightarrow ad = bc \\
 P(X = 0, Y = 1) &= P(X = 0)^* P(Y = 1) \Leftrightarrow c = (a + c)^* (c + d) = \\
 c^2 + ad + cd + ac &\Leftrightarrow ad = c^* (1 - a - c - d) \Leftrightarrow ad = bc \\
 P(X = 1, Y = 0) &= P(X = 1)^* P(Y = 0) \Leftrightarrow b = (a + b)^* (b + d) = \\
 b^2 + ab + ad + bd &\Leftrightarrow ad = b^* (1 - a - b - d) \Leftrightarrow ad = bc \\
 P(X = 1, Y = 1) &= P(X = 1)^* P(Y = 1) \Leftrightarrow d = (b + d)^* (c + d) = \\
 d^2 + bc + bd + cd &\Leftrightarrow bc = d^* (1 - b - c - d) \Leftrightarrow ad = bc
 \end{aligned}$$

.ב.

r	0	1
$P(XY=r)$	$a+b+c$	d

ג. כבר הוכחנו

$$E[XY] = E[X]^* E[Y] \Leftrightarrow ad = bc \quad \text{ב''ת } X, Y \quad \text{לכן מספיק להוכיח}$$

$$E[XY] = d \text{ and } E[X] = b + d \text{ and } E[Y] = c + d$$

$$\begin{aligned}
 \text{so } E[XY] &= E[X]^* E[Y] \Leftrightarrow d = (b + d)^* (c + d) \Leftrightarrow d = bc + bd + cd + d^2 \\
 &\Leftrightarrow d(1 - b - c - d) = bc \Leftrightarrow ad = bc
 \end{aligned}$$

.3

W/B	2	3
0	3/10	0
1	2/10	1/10
2	1/10	3/10

r	2	3	4	5
$P(B+W=r)$	3/10	2/10	2/10	3/10

$$E[B + W] = \frac{1}{10} * (2 * 3 + 3 * 2 + 4 * 2 + 5 * 3) = 3.5$$

.א. סכום התוצאות כאמור.

S	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
P(X=S)	$\frac{1}{216}$	$\frac{3}{216}$	$\frac{6}{216}$	$\frac{10}{216}$	$\frac{15}{216}$	$\frac{21}{216}$	$\frac{25}{216}$	$\frac{27}{216}$	$\frac{27}{216}$	$\frac{25}{216}$	$\frac{21}{216}$	$\frac{15}{216}$	$\frac{10}{216}$	$\frac{6}{216}$	$\frac{3}{216}$	$\frac{1}{216}$

$$E[X] = \sum_s s * P(X=s) = \frac{2268}{216} = 10.5$$

$$E[X^2] = \sum_s s^2 * P(X=s) = \frac{25704}{216} = 119$$

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 8.75$$

ב. אפשר להסכל על X בטור X_i , כאשר ב' $X = X_1 + X_2 + X_3$ מסמל הטלה הקובייה.
ידוע עליהם שהם ב"ת זהים וכך $X = 3X_1$

I	1	2	3	4	5	6
P(X ₁ =i)	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$$E[X] = E[3X_1] = 3 * E[X_1] = 3 * \frac{1}{6} * (6 * \frac{7}{2}) = 10.5$$

$$E[X_1^2] = \frac{1}{6} * \sum_{i=1}^6 i^2 = 15\frac{1}{6}$$

$$Var(X_1) = E[X_1^2] - (E[X_1])^2 = 2\frac{11}{12}$$

$$Var(X) = Var(3X_1) = 3Var(X_1) = 3 * 2\frac{11}{12} = 8.75$$

5. נסמן ב X ו ב Y בהתאם, את הזמנים (בדיקות) לאחר השעה 12:00 שבhem הגבר והאישה מגיעים לפגישה. X ו Y הם מ"מ ב"ת, בעלי התפלגות איחודית בקטע $[0,60]$.
לכן, ההסתברות המבוקשת היא $P(X+10 < Y) + P(Y+10 < X)$.
משמעותי סימטריה הסתברות זו שווה ל $2P(X+10 < Y)$ והוא מתקיים כך -

$$\begin{aligned} 2P(X+10 < Y) &= 2 \iint_{X+10 < Y} f(x,y) dx dy = 2 \iint_{X+10 < Y} f(x)f(y) dx dy = 2 \int_{10}^{60} \int_0^{y-10} \left(\frac{1}{60}\right)^2 dx dy \\ &= \frac{2}{60^2} \int_{10}^{60} (y-10) dy = \frac{25}{36} \end{aligned}$$