

פונקציות מרוכבות למהנדסים

תרגיל כיתה 7: פונקציות אלמנטריות (המשך)

1. הפונקציה z^α מוגדרת ע"י $z = e^{\alpha \ln z}$, כאשר α מספר מרוכב ו
 $z = re^{i\varphi}$ עבור $\ln z = \ln |z| + i \arg(z) = \ln r + i(\varphi + 2\pi k)$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
 (באופן דומה מגדירים את הפונקציה המעריכית a^z עבור a מרוכב).

(א) חשבו את i^i .

$$i^i = e^{i \ln i} = e^{i[\ln |i| + i \arg(i)]} = e^{i[\ln 1 + i(\pi/2 + 2\pi k)]} = e^{-(\pi/2 + 2\pi k)}$$

(ב) חשבו את $\ln i^i$

מאחר ו i^i ממשי נקבל

$$\ln i^i = \ln |i^i| + i \arg(i^i) = -(\pi/2 + 2\pi k) + 2\pi m i$$

שלמים.

(שימו לב כי באופן כללי $\ln i^i \neq i \ln i$ שוויון מתקבל עבור ענפים של $\ln i^i$ עם $m = 0$).

2. (א) הוכיחו כי $\ln z^\alpha = \alpha \ln z$ לכל α ממשי

$$\ln z^\alpha = \ln |z^\alpha| + i \arg(z^\alpha) = \ln |z|^\alpha + i \alpha \arg(z) = \alpha (\ln |z| + i \arg(z)) = \alpha \ln z$$

(ב) פתרו את המשוואה $e^z + 1 = 0$

$$\ln e^z = z = \ln(-1) = i(\pi + 2\pi k) \text{ ולכן } e^z = -1$$

3. הוכיחו כי לכל α, β מרוכבים

$$z^{\alpha+\beta} = z^\alpha z^\beta \quad (\text{א})$$

$$z^{\alpha+\beta} = e^{(\alpha+\beta) \ln z} = e^{\alpha \ln z + \beta \ln z} = e^{\alpha \ln z} e^{\beta \ln z} = z^\alpha z^\beta$$

$$(z^\alpha)^\beta \quad (\text{ב})$$

$$(z^\alpha)^\beta = (e^{\alpha \ln z})^\beta = e^{\beta \ln e^{\alpha \ln z}} = e^{\beta \alpha \ln z} = z^{\alpha\beta}$$

$$z^{-\alpha} = 1/z^\alpha \quad (\text{ג})$$

$$z^{-\alpha} = e^{-\alpha \ln z} = 1/e^{\alpha \ln z} = 1/z^\alpha$$