

## תרגיל 6

חשבו את האינטגרלים הלא מסוימים הבאים:

$$\int \frac{x + \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[6]{x}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx .1$$

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - x + 1}} dx .2$$

$$\int \frac{1}{(1+x)\sqrt{1+x-x^2}} dx .3$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{(7x-10-x^2)^3}} dx .4$$

$$\int \frac{2}{(2-x)^2} \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} dx .5$$

$$\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx .6$$

$$\int \frac{1}{1+\sin x+\cos x} dx .7$$

$$\int \frac{\sin 2x}{1+\sin^2 x} dx .8$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx .9$$

$$\int \frac{x^4}{x^4-1} dx .10$$

$$\int \frac{x^3+3x^2+5x+7}{x^2+2} dx .11$$

$$\int \frac{x^5}{(x^3+1)(x^3+8)} dx .12$$

$$\int \cos 3x \cos 2x .13$$

$$\int \cos x \cos 2x \cos 4x .14$$

$$\int \tan^2 x .15$$

**בנהר!**