

תרגיל 2

להגשה בשבוע המתחיל ב 20.3.2016

1. תרגיל חימום, איך מחשבים דטרנמיננטה בשילוב אינדוקציה/רקורסיה: תהא

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

כלומר, המטריצה A_n היא מטריצה ממשית מגודל $n \times n$ המוגדרת ע"י: על האלכסון הראשי יש 2 ועל האלכסונים המשניים שמעל ומתחת לאלכסון הראשי יש 1. כל שאר הכניסות שוות 0. למשל

$$A_1 = (2), A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

ומכאן ישירות ש $|A_1| = 2, |A_2| = 3, |A_3| = 4, |A_4| = 5, |A_5| = 6$. מזהים חוקיות? בוא נוכיח:

(א) פתחו את הדטר' של A_n (עבור $n > 2$) לפי שורה ראשונה וקבל את הנוסחא הרקורסיבית (השלימו את החסר)

$$|A_n| = 2|A_{n-1}| - 1 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

(זיכרו שניתן לפתח גם לפי עמודות)

(ב) הוכיחו בעזרת אינדוקציה (או כל דרך אחרת) כי

$$|A_n| = n + 1$$

2. ועכשיו אתם! יהא n טבעי ויהיו $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ מספרים מרוכבים. נגדיר מטריצת ונדרמונט להיות

$$V(a_0, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & a_0 & a_0^2 & \dots & a_0^{n-1} \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \dots & a_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

למשל

$$V(3, 2, 4) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3^2 \\ 1 & 2 & 2^2 \\ 1 & 4 & 4^2 \end{pmatrix}$$

(א) הוכיחו כי

$$|V(a_0, \dots, a_{n-1})| = \prod_{0 \leq i < j \leq n-1} (a_j - a_i)$$

למשל

$$|V(3, 2, 4)| = (4 - 2)(4 - 3)(2 - 3)$$

הדרכה: בצעו את פעולות העמודה האלמנטריות הבאות לפי הסדר הבא

- $C_n - a_0 C_{n-1} \rightarrow C_n$ •
- $C_{n-1} - a_0 C_{n-2} \rightarrow C_{n-1}$ •
- עד $C_2 - a_0 C_1 \rightarrow C_2$ •

• השתמשו ברקורסיה/אינדוקציה על מנת להגיע לפתרון.

כאשר C_i זה עמודה i של המטריצה (שימו לב שפעולות אלו לא משנות את הדטרמיננטה)

(ב) הסיקו כי עבור $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ מספרים שונים, המטריצה $V(a_0, \dots, a_{n-1})$ הפיכה. זיכרו תרגיל זה עד הקורס באלגוריתמים 1:

3. תהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה עם רכיבים שלמים. כלומר לכל i, j מתקיים כי $A_{i,j} \in \mathbb{Z}$. נתון כי $|A| = 7$.

(א) יהא $b \in \mathbb{R}^n$ וקטור עם רכיבים שלמים ונסתכל על המערכת המשוואות

$$Ax = b$$

(שימו לב שקיים פתרון יחיד למערכת זאת כי A הפיכה). נסמן $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ הוכיחו כי $x_1 \neq \frac{2}{3}$.

(ב) נגדיר $A_6 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ משאלה 1. זוהי דוגמא למטריצה מהסעיף הקודם. כלומר $|A_6| = 7$. עוד נגדיר

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נסתכל על המערכת המשוואות

$$Ax = b$$

נסמן $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_6 \end{pmatrix}$. חשב את x_1

4. תהא $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$. הוכיחו כי מתקיים

$$\text{adj}(A)^t = \text{adj}(A^t)$$

בהצלחה!