

בס"ד

אוניברסיטת בר-אילן  
מבחן בקורס: אלגברה מופשטת 1 (סמסטר קיץ 2011)  
מספרי הקורס: 88211  
המרצה: מיכאל מגרל  
המתרגלים: לואי פולב ודורון פרלמן  
מועד ב'  
חומר עזר: רק מחשבון רגיל  
משך המבחן: שעתיים וחצי

יש לפתור בדיוק 4 מתוך 5 שאלות (כל שאלה שווה 25 נקודות)  
בנוסף יש גם שאלת בונוס השווה 5 נקודות.

## פתרונות חלקיים 25/08/2013

1. א. הוכיחו שכל חבורה  $G$  עם  $|G| = p^n$  איברים ( $p$  ראשוני) תמיד פתירה.  
ב. (7 תירגול) תהא  $G$  חבורה מסדר  $p^2q$  עבור  $p, q$  ראשוניים. הוכיחו ש- $G$  לא

פשוטה.

פתרון:

אם  $r_p = 1$  או  $r_q = 1$  אז סיימנו. אחרת נניח  $r_p = q \wedge r_q \in \{p, p^2\}$ .

אם  $Q$  היא תת חבורה  $q$ -סילו אזי היא ציקלית וכל איבר ב- $Q \setminus \{e\}$  יוצר אותה. לכן יש ב-

$G$  איברים מסדר  $q$ .

אם  $r_q = p^2$  אזי יש  $p^2(q-1)$  איברים מסדר  $q$ . מכיוון שיש ב- $G$  איברים, נקבל

שנותרו רק  $p^2$  איברים שאיחודם הוא תת חבורה מסדר  $p^2$ .

נהסבר למשפט האחרון:  $|G| = p^2$  ולכן יש תת חבורה מסדר  $p^2$  שבה כל האיברים הם מסדר

שמחלק את  $p$ . יש  $p^2(q-1)$  איברים מסדר  $q$ . לא מחלק את  $p$  ולכן ה- $p^2$  איברים

האלה זה מה שנותר.

זאת אומרת, יש תת חבורה יחידה מסדר  $p^2$  והיא תת חבורה  $p$ -סילו ולכן  $r_p = 1$ , בסתירה

להנחה הראשונית.

לכן  $r_q = p$  וגם  $r_p = q$  ולכן  $p \equiv 1 \pmod{q} \wedge q \equiv 1 \pmod{p}$  וזאת סתירה, כי אם למשל

$p < q$  (בה"כ) אזי  $p \equiv p \pmod{q} \not\equiv 1 \pmod{q}$ .

ג. הוכיחו ש  $G/H$  אבלית אם  $G' \subseteq H$ .

2. א. הוכיחו את משפט Lagrange.

ב. הוכיחו שאם  $f: X \rightarrow Y$  אפימורפיזם של חבורות סופיות אזי  $|Y|$  מחלק את  $|X|$ .

ג. (תירגול 5) הוכיחו שבחבורה  $A_4$  לא קיימת ת"ח עם 6 איברים.

פתרון:

נתבונן ב- $A_4$ . מתקיים  $|A_4| = 12$ . כמו כן 6 מחלק את 12, ונראה שאין ל- $A_4$  תת חבורה מסדר 6.

נניח בשלילה שקיימת  $H \leq A_4$  כך ש- $|H| = 6$ . אזי  $[A_4 : H] = 2$ . לכן, לפי תרגיל משיעור קודם,

האיברים ב- $A_4$  הם מהצורה  $(---)$  או  $(--)(--)$  ולכן הסדרים האפשריים הם 1,2,3.

לכל  $\sigma \in A_4$  מתקיים  $\sigma^2 \in H$ . יהי  $\sigma \in A_4$  מחזור מאורך 3. אזי  $\sigma^2 \in H$  וכן

$\sigma^2 \sigma^2 = \sigma^4 = \sigma \in H$ . כל המחזורים מאורך 3 נמצאים ב- $A_4$  ועכשיו ראינו שהם נמצאים גם

ב- $H$ . מספר המחזורים מאורך 3 ב- $H$  הוא:  $2! \binom{4}{3} = 8$ . זאת אומרת שיש ב- $H$  לפחות 8

איברים, וזו סתירה להנחה  $|H| = 6$ .

3. א. נניח  $G$  חבורה מסדר  $p^2$  כאשר  $p$  ראשוני. הוכיחו ש- $G$  אבלית ומתקיים  $|Aut(G)| > p^2 - 2p$ .

פתרון: (אבליות) ל  $G$  יש מרכז לא טריוויאלי. בה"כ  $\langle h \rangle = H$  עם  $p$  אלמנטים.  $\langle [a] \rangle = G/H$  ציקלית. כל איבר ב  $G$  ניתן להציג כ  $a^i h^j$ . הם מחלפים ... אם  $G = \mathbb{Z}_{p^2}$  אז יש  $\varphi(p^2) = p^2 - p$  אוטומורפיזמים.

בה"כ  $G = \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ . מספר אוטומורפיזמים של  $\mathbb{Z}_p$  שווה  $p-1$ . לכן מספר אוטומורפיזמים ב  $G = \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$  לפחות  $(p-1)^2$  ...

ב. הוכיחו או הפריכו:  $\mathbb{C}^*/T \cong \mathbb{R}$  ו  $\mathbb{R}/\mathbb{Q} \cong T/\Omega_\infty$

(כאשר  $T := \{z \in \mathbb{C} \mid \|z\| = 1\}$  ו  $\Omega_\infty$  חבורה של כל שורשי יחידה).

ג. עבור החבורה  $G := U_{10} \times \mathbb{Z}_{35}$  תארו תמונות אפימורפיות ומצאו  $|Aut(G)|$ .

4. (שיעורי בית 3 שאלה 10 סעיף ד)

א. נתבונן ב- $S_6$  ובקבוצה הבאה:  $H = \{\sigma \in S_6 : \sigma(2) = 2, \sigma(4) = 4, \sigma(6) = 6\}$ .

הוכיחו ש- $H$  היא תת-חבורה ושהיא איזומורפית ל- $S_3$ .

ב. האם היא תת חבורה נורמלית?

ג. הוכיחו שב- $N(H)$  יש שתי תת-חבורות  $K, L$  כך ששתיהן איזומורפיות ל- $S_3$  ו-

$$L \cap K = \{id\}$$

5. א. הוכיחו את משפט Burnside.

ב. מצאו את מספר הלוחות  $4 \times 4$  הלא שקולים עד כדי סיבובים אם מותר לצבוע ב 3

צבעים קבועים.  
 ג. הוכיחו שכל פעולה  $G \times X \rightarrow X$  עם מסלול אחד איזומורפית לפעולה מהטיפוס  
 $G \times G/H \rightarrow G/H, (g, tH) \mapsto (gt)H$ .

**שאלת הבונוס: (5 נקודות)**

נניח  $S_p$  חבורה סימטרית כאשר  $p$  ראשוני.

א. מצאו כמה ת"ח מסדר  $p$  קיימות ב  $S_p$ .

תשובה:  $(p-2)!$

פתרון:

מספר אברים ב  $S_p$  בעלי סדר  $p$  שווה למספר עגילים אורך  $p$  ז"א  $p!/p = (p-1)!$ .

הם כולם נמצאים בתתי חבורות מסדר  $p$  שמספרן שווה ל  $n_p$ . יש בדיוק  $p-1$  כאלה בכל

תת חבורה כזאת. לכן  $(p-1)! = n_p(p-1)$

מכאן  $n_p = (p-2)!$

ב. באמצעות (א) הוכיחו  $p \mid (p-1)! + 1$  (משפט Wilson).

בגלל (א) ומשפט סילו 3 נקבל  $(p-2)! \equiv 1 \pmod p$  ומכאן נובע משפט

ווילסון  $(p-1)! \equiv p-1 \pmod p$ .

😊 **בהצלחה ושנה טובה !**