

שאלות לתרגיל 3:

1.

a. יהיו $v_1 = (1, 0, 1, 0), v_2 = (0, 2, 1, 1), v_3 = (1, 2, 1, 2)$ ויהיה $u = (x, y, z, w)$. מצא תנאים על x, y, z, w (מערכת משוואות לינאריות) כך ש u יהיה שייך ל Span של v_1, v_2, v_3 .

b. פתור את מערכת המשוואות שמצאת בסעיף א' על מנת לקבל וקטור כללי ב $\text{Span}\{v_1, v_2, v_3\}$ (הוא וקטור הפתרון הכללי כמובן).

c. מצא מערכת משוואות דומה לסעיף א' עבור

$$w_1 = (1, 1, 0, 0), w_2 = (0, 1, 1, 0), w_3 = (0, 0, 1, 1)$$

d. נסמן $V = \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}, W = \text{span}\{w_1, w_2, w_3\}$ עבור הוקטורים מהסעיפים הקודמים. הוכח: $u \in V \cap W$ אם ורק אם u מקיים את מערכת המשוואות שמכילה את כל המשוואות מסעיף א' וגם מסעיף ג'.

e. מצא בסיס ל $V \cap W$ באמצעות פתרון המערכת מהסעיף הקודם.

הערה: התרגיל הזה הוא כמובן דוגמא פרטית לאלגוריתם כללי לחשב בסיס לחיתוך.

2. יהא M ויהיו $A, B \subseteq V$ שתי קבוצות הוכח/הפריך:

a. $A = \text{Span}(A)$ אם A תת מרחב וקטורי

b. $\text{Span}(A \cap B) = \text{Span}(A) \cap \text{Span}(B)$

c. $\text{Span}(A \cup B) = \text{Span}(A) \cup \text{Span}(B)$

d. אם $A \subseteq B$ אזי $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$

e. אם $\text{Span}(A) = \text{Span}(B)$ אזי $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$

f. אם $\text{Span}(A) = V$ אזי $B \subseteq A$

3.

a. יהיו $p_1 = 1 + x + x^2 + x^3, p_2 = x^2 - 1, p_3 = 1 - x + x^2 - x^3$ פולינומים, ויהי

$$p_4 = 1 + x^2 + 2x^3$$

האם $p_4 \in \text{Span}\{p_1, p_2, p_3\}$?

b. האם $\{p_1, p_2, p_3\}$ מהסעיף הקודם בת"ל?

c. האם $\{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ מהסעיף הראשון בת"ל?

d. יהא V מ"ו כלשהוא, ויהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ וקטורים בת"ל, ויהיה וקטור u כך ש

$$u \notin \text{Span}\{v_1, \dots, v_n\}$$

הוכח/הפריך: v_1, \dots, v_n, u בת"ל.