

פתרונות תרגיל בית 5 באלגברה מופשטת

88-211 סמסטר א' תשע"ו

שאלה 1. תהי החבורה הדיאדרלית מסדר 8. תארו את כל תת-חברות הלא טריויאליות שלה, והוכיחו שכולם אбелיות. האם כלן ציקליות? פתרו. נציג את החבורה בצורה הרגילה, כחבורה הנוצרת על ידי האיברים σ , סיבוב ב- 90° ו- $-\pi$, שיקוף לגבי ציר קלשו של הריבוע. ככלומר בכתיב של יוצרים ויחסים:

$$D_4 = \langle \sigma, \tau : \sigma^4 = \tau^2 = \text{id}, \sigma\tau = \tau\sigma^{-1} \rangle$$

ידוע לנו כי $|D_4| = 8$. לפי משפט לנגראנז' הסדרים האפשריים היחידים של תת-חברות הטעים של D_4 הם $\{1, 2, 4, 8\}$. הסדרים 1 ו-8 מתקיימים עבור תת-חברות הטריויאליות. מסתבר שיש חמישה תת-חברות מסדר 2 והן

$$\langle \sigma^2 \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \tau\sigma \rangle, \langle \tau\sigma^2 \rangle, \langle \tau\sigma^3 \rangle$$

יש גם שלוש תת-חברות מסדר 4 והן

$$\langle \sigma \rangle, \langle \sigma^2, \tau \rangle = \{\text{id}, \sigma^2, \tau, \tau\sigma^2\}, \langle \sigma^2, \tau\sigma^3 \rangle = \{\text{id}, \sigma^2, \tau\sigma^3, \tau\sigma\}$$

קל לראות שכל תת-חברות הציקליות הן אбелיות. לגבי תת-חברות $\langle \sigma^2, \tau, \tau\sigma^3 \rangle$ בדיקה ישירה תראה שהן אбелיות (למשל על ידי טבלת כפל), אבל הן לא ציקליות כי אין בהן איבר מסדר 4.

שאלה 2. נגדיר את המפרק של חבורה G להיות

$$Z(G) = \{g \in G : \forall h \in G, gh = hg\}$$

זהינו זהה האוסף של כל האיברים ב- G -شمתקפים עם כל איברי G .

א. הוכיחו כי לכל חבורה G מתקיים $Z(G) \triangleleft G$.

ב. מצאו את $Z(D_3)$ ואת $Z(S_3)$.

ג. הוכיחו $\{e\} = \langle \sigma^n \rangle$ וכי $Z(D_{2n+1}) = \langle \sigma^n \rangle$ עבור $n > 1$. רמז: איך נראה איבר כללי בחבורה הדיאדרלית?

פתרו. א. נראה בשלבים כי $Z(G) \leq G$. ברור ש- $e \in Z(G)$ כי e מתחלף עם כל איבר. יהיו $x, y \in Z(G)$, אז נשים לב שלכל $h \in G$ מתקיים כי

$$xyh = xhy = hxy$$

ולכן $xy \in Z(G)$. כמו כן מפני שמתקיים $xh = hx$, אז גם $hx^{-1} = x^{-1}h$, ולכן $x^{-1} \in Z(G)$. ככלומר המרכז סגור לפעללה ולהופכי.icut נראה נורמליות. יהי $k \in G$ אז נראה שיוויון בין המחלקה השמאלית לבין המחלקה הימנית לפי התחלפות האיברים במרכז:

$$kZ(G) = \{kg : \forall h \in G, gh = hg\} = \{gk : \forall h \in G, gh = hg\} = Z(G)k$$

ולכן $Z(G)$ תת-חבורה נורמלית של G .

ב. המרכז של S_3 הוא תת-חבורה, ולכן הסדר שלו חייב לחלק את 6. $|S_3| = 6$. הוא לא יכול להיות 6 כי אז נקבל $Z(S_3) = S_3$, והרי S_3 לא אбелית. אנחנו יודעים כי $(1 2 3) = a$ לא מתחלף עם $(1 2)$. $b = (1 3)$. ככלומר שניים לא במרכז. לכן גם $(3 2 1) = a^{-1} \notin Z(S_3)$. מהתרגיל הקודם אנו יודעים כי $(2 3)$ ו- $(1 3)$ לא מתחלפים ביניהם. $Z(S_3) = \{\text{id}\}$. $S_3 \cong D_3$, ולכן $Z(D_3) = \{\text{id}\}$. לעומת זאת \mathbb{Z}_4 היא אбелית. אפשר לשים לב כי $Z(G \times H) \cong Z(G) \times Z(H)$. לכן נקבל כי

$$Z(D_3 \times \mathbb{Z}_4) = Z(D_3) \times Z(\mathbb{Z}_4) = \{(\text{id}, 0), (\text{id}, 1), (\text{id}, 2), (\text{id}, 3)\}$$

ג. נתחיל בכך שנשים לב שכל איבר של D_n יכול להכתב בצורה $\tau^i \sigma^j$ כאשר $i \in \{0, 1\}$ ו- $j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. מהיחס $\sigma \tau = \tau \sigma^{-1}$ אפשר בקלות לקבל את היחסים $\tau \sigma = \sigma \tau$ לכל k . כמו כן, מפני שהקבוצה $\{\sigma, \tau\}$ יוצרת את D_n , אז איבר $\alpha \in D_n$ נמצא במרכז אם ורק אם הוא מתחלף עם קבוצת היוצרים (וזהו שאותם מביניהם ומה זה נכון גם לחבורות אחרות!). נניח $\tau^i \sigma^j \in Z(D_n) = \alpha \tau^i \sigma^j \tau = \alpha \sigma^j \tau = \alpha$, כלומר כ- τ מושם ב- σ^j , אך אחרי כפל משמאל ב- τ^i נקבל

$$\tau^i \sigma = \sigma \tau^i$$

זה יתכן אם $i = 0$. אך זה לא יתכן אם $i = 1$, הרי נקבל $\tau \sigma = \sigma \tau$ וידוע לנו שהם לא מתחלפים (עבור $n \geq 3$). ככלומר האברים שאנו מוחפשים הם מן הצורה $\sigma^j \alpha$. כעת נבדוק התחלפות עם τ , ככלומר מתי $\tau \alpha = \alpha \tau$. זה יקרה אם $\tau = \tau \sigma^j = \sigma^j \tau$ ולפי היחסים שקיבלו לעיל, זה שקול ל- $\tau \sigma^{-j} = \sigma^{-j} \tau$, כלומר מתי $\tau = \sigma^{2j} = \text{id}$. ידוע לנו כי $n = (\sigma)^o$, אז התשובה היא רק כאשר $j = 0$ או $\frac{n}{2}$. זה בדיק הפיצול לפי הזוגיות בשאלת.

קיבלו שבסקרה ו- $n = 2m + 1$ אי זוגי, אז $Z(D_{2m+1}) = \{\text{id}\}$ ו- $n = 2m$ זוגי, אז $Z(D_{2m}) = \{\text{id}, \sigma^m\}$. להשלמת התמונה, נשים לב כי החבורות D_1 ו- D_2 הן אбелיות, ולכן המרכז שלהם הוא כל החבורה.

שאלה 3. בכל סעיף נתונים דוגמה לחבורה G ותת-חבורה $H \leq G$ המקיימות את התנאים. רמז: אפשר להעזר בשאלת הקודמת.

א. הכליה ממש $Z(H) \subset Z(G)$

ב. הכליה ממש $Z(G) \subset Z(H)$

ג. לא מכיל את $Z(H)$ ולא מוכל בו.

פתרון. א. אפשר לבחור כל חבורה אбелית ותת-חבורה ממש שלה. למשל $G = \mathbb{Z}$ ואת $H = 2\mathbb{Z}$.

ב. אפשר להעזר בשאלת הקודמת. אם $G = S_3$, אז המרכז שלה טריויאלי. נבחר $H = \langle(1 2 3)\rangle$ שהיא תת-חבורה ציקלית של S_3 , ובפרט אбелית, ולכן $Z(G) = \langle\sigma\rangle$. אפשר לבחור גם את $G = D_5$ עם $H = \langle\tau\rangle$.

ג. גם כאן אפשר להעזר בשאלת הקודמת, ובבחירה $G = D_4$, $H = \langle\tau\rangle$. ידוע לנו כי $Z(H) = H = \{\text{id}, \tau\}$ כי היא ציקלית.

שאלה 4. בכל סעיף נתונה חבורה G ותת-חבורה $H \leq G$. תארו את G/H , אוסף המחלקות השמאליות של H ב- G .

א. $H = \langle 9 \rangle, G = U_{10}$.

.ב. כאשר e_1 הוא איבר היחידה של G_1 . $H = \{e_1\} \times G_2$, $G = G_1 \times G_2$.

.ג. כאשר σ היא האיבר שמקביל לסיבוב ב- 60° מעולות.

.ד. $H = \mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R}^* : x > 0\}$, $G = (\mathbb{R}^*, \cdot)$.

פתרונות. א. נשים לב כי $\varphi(10) = 4$, וכן יש ארבעה איברים בחבורה $\{1, 3, 7, 9\}$. $T_{10} = \{1, 3, 7, 9\}$. $H = \{1, 9\}$ היא מסדר 2, וכן יש שתי מחלקות טlementary: H ו- $.3H = \langle 3, 7 \rangle$

ב. המחלקות הן מן הצורה $(g_1, g_2) \cdot (\{e_1\} \times G_2)$. אפשר לראות כי קבוצת המחלקות היא בהתאם חח"ע ועל לאברי G_1 לפי

$$(g_1, g_2) \cdot (\{e_1\} \times G_2) = \{(g_1, k) : k \in G_2\} \leftrightarrow g_1 \in G_1$$

ג. ידוע לנו כי $|G| = 12$ וכמו כן $H = \{\text{id}, \sigma^2, \sigma^4\}$. לכן יש ארבע מחלקות טlementary וهن

$$H, \sigma H = \{\sigma, \sigma^3, \sigma^5\}, \quad \tau H = \{\tau, \tau\sigma^2, \tau\sigma^4\}, \quad \tau\sigma H = \{\tau\sigma, \tau\sigma^3, \tau\sigma^5\}$$

ד. אם $a \in \mathbb{R}^+$, אז המחלקה השמאלית של a היא $a\mathbb{R}^+ = \mathbb{R}^+$. אחרת $a < 0$ ונקבל $a\mathbb{R}^+ = \{ax : x < 0\} = \mathbb{R}^-$.

שאלה 5 (אתגר). תהינה $\tau, \sigma \in S_n$ תמורה לכך שמתוקים $\tau^2 = \sigma$. במקרה זה נאמר כי τ היא שורש של σ . מצאו תנאים מספקים והכרחיים שקבע האם לתמורה נתונה $\sigma \in S_n$ יש שורש. אם קיימים שורש, איך אפשר לחשב אותו מפורשות?

פתרונות. מבוסס על התשובה בקישור <http://math.stackexchange.com/a/266605> כל תמורה היא מכפלה של מהזורים זרים $\tau = c_1c_2 \dots c_k$. מפני שהזורים זרים מתחלפים נקבל כי

$$\tau^2 = c_1c_2 \dots c_kc_1c_2 \dots c_k = c_1^2c_2^2 \dots c_k^2$$

כלומר לתמורה יהיה שורש אם היא מכפלה של ריבועי מהזורים זרים, כמו c_i^2 . בוגת ציריך לבדוק מתי מהзор הוא ריבועי. נניח כי המзор $c = (i_1i_2 \dots i_m)$ הוא מאורך m . בדקו שאם m הוא זוגי, אז גם c^2 הוא מהзор מאורך m . אפשר להeur בכך ש- $1 = (m, 2)$. אם m זוגי נקבל כי

$$c^2 = (i_1i_3 \dots i_{m-1})(i_2i_4 \dots i_m)$$

שהיא מכפלה של שני מהזורים זרים מאורך $\frac{m}{2}$. בסך הכל קיבלנו שלתמורה יש שורש אם ורק אם בהצגה של התמורה ל מהזורים זרים, לכל m זוגי מספר המהזרים מאורך m הוא זוגי. במקרה ולתמורה σ יש שורש, נוכל לפיה התיאור הזה למצוא את השורש: נציג את σ כמכפלת מהזורים זרים $d_1d_2 \dots d_k$. לכל מהзор מאורך m אי זוגי נוכל למצוא את השורש שלו בתור d_i

$$\sqrt{d_i} = (i_1i_{(m+3)/2}i_2i_{(m+5)/2} \dots i_{(m-1)/2}i_mi_{(m+1)/2})$$

כאשר האינדקסים נקבעים מודולו m , ולכל מהзор מאורך m זוגי, יהיה מהзор $d'_i = (j_1j_2 \dots j_m)$ מאורך m בהצגה של σ וنוכל לבנות את השורש

$$\sqrt{d_i d'_i} = (i_1j_1i_2j_2 \dots i_mj_m)$$

שאלה 6 (אתגר). צפו בפרק 10 בעונה 6 של הסדרה פיז'רמה.

א. רשמו את עשרים החילופים המתבצעים בפרק, ובדקו שמכפלתם היא אכן מכפלת זהות. הדרכה: היו עקביים, ורשמו בכל מקרה את הגופים המחליפים זהיות או את זהויות המחליפות גופים.

ב. נאמר שסדרת חילופים היא נאותה אם אף חילוף אינו מופיע בה יותר מאשר פעם אחת. בפרק, פרופסור פארנסוורת' מצהיר שככל סדרה נאותה של חילופים על n עצמים אפשר להמשיך לסדרה נאותה על $n+1$ העצמים ועוד שניים, כך שמכפלת כל החילופים היא זהות. תן דוגמה נגדית למשפט זה, אם מסתפקים ב- n העצמים ועוד אחד.

ג. נסו להוכיח את המשפט.
רמזים וSpoilers בסרטון הזה מאת [Mathologer](#) וברשותה [זהות בבלוג המומלץ](#)
"לא מדויק" של גדי אלכסנדרוביץ'.

בהצלחה!