

# פתרון תרגיל בית 6 – מופשטת קיץ 2013

## שאלה 1

- א. מצא כמה לוחות  $3 \times 3$  לא שקולים קיימים (עד כדי סימטריות של הריבוע) אם מותר לצבוע ב-2 צבעים.  
 ב. כמה לוחות  $5 \times 5$  לא שקולים (לגבי הסיבובים) קיימים אם מותר לצבוע את הלוחות ב-3 צבעים קבועים.

## פתרון

- א. נגדיר את מרחב הפעולה ככל הצביעות האפשריות של הלוח:  $X = \{f : \{1, 2, 3, \dots, 9\} \rightarrow \{0, 1\}\}$  , ונפעל עליו עם החבורה הדיהדרלית  $D_4$ . נחשב את כל הגדלים הדרושים:

$g \in D_4$	$ X_g $	סה"כ
$id$	$2^9$	$2^9$
$\sigma, \sigma^3$	$2^3$	$2 \cdot 2^3$
$\sigma^2$	$2^5$	$2^5$
$\tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau, \sigma^3\tau$	$2^6$	$4 \cdot 2^6$


לבסוף נקבל על פי משפט ברנסייד כי מספר המסלולים הינו 102, שכן

$$k = \frac{1}{8}(2^9 + 2 \cdot 2^3 + 2^5 + 4 \cdot 2^6) = 102$$

- ב. הלוחות שקולים עד כדי סיבובים, ז"א שהחבורה הפועלת תהיה  $A = \{id, \sigma, \sigma^2, \sigma^3\} \leq D_4$  כאשר  $\sigma$  הוא סיבוב ב- $90^\circ$  בכיוון השעון. נסמן

ב- $X$  את אוסף כל הצביעות האפשריות. מתקיים  $X = (\mathbb{Z}_3)^{25}$ . נרצה להשתמש בלמה של ברנסייד ולכן עלינו לחשב את מספר נקודות השבת בפעולה של כל אחד מאיברי החבורה.


$|X_{id}| = 3^{25}$ , שכן תמורת הזהות אינה מזיזה את הריבוע ולכן מותר לנו לצבוע כל משבצת כרצוננו.  $|X_\sigma| = 3^7$ , שכן קל להשתכנע כי  $\sigma$  שומרת במקומם ריבועים מהצורה:



[שימו לב שאין חשיבות לצבעים בתמונה; הצבעים השונים נועדו לסמן את המשבצות שאמורות להיות באותו צבע]. ניתן לראות שיש לנו חופש לבחור לצבוע 7 משבצות ב-3 צבעים, וכל שאר המשבצות יקבעו בהתאם.

שכן  $|X_{\sigma^3}| = 3^7$ ,  $\sigma^3$  היא סיבוב ב- $90^\circ$  נגד כיוון השעון (ולכן היא מתנהגת כמו  $\sigma$ ).

שכן היא משאירה במקום ריבועים מהצורה:  $|X_{\sigma^2}| = 3^{13}$



בסה"כ נקבל: מספר המסלולים השונים (משמע, מספר הצביעות

$$k = \frac{1}{4}(3^{25} + 2 \cdot 3^7 + 3^{13}) \text{ (השונות) הוא:}$$

מש"ל

## שאלה 2

תהי  $G$  חבורה סופית מסדר אי זוגי. הוכיחו שלכל  $x \in G, x \neq 1$ , אינו צמוד להופכי שלו.

(שימו לב שיש יותר מדרך אחת לפתור שאלה זו, אך על מנת לתרגל את המושגים הטריים יותר, נסו לפתור אותה באמצעות מחלקות צמידות.)

## פתרון

יהי  $x \in G, x \neq 1$  ונניח בשלילה שהוא צמוד לעצמו, כלומר  $x^{-1} \in \text{conj}(x)$ . לכן מחלקת השקילות של  $x$  מכילה לפחות שני איברים. היא אינה יכולה להיות מסדר זוגי (כי סדרה חייב לחלק את סדר החבורה) ולכן קיים  $y \neq x, x^{-1}$  שנמצא במחלקת השקילות של  $x$ . נניח בה"כ ש- $y$  צמוד ל- $x$ . לכן  $y^{-1}$  צמוד ל- $x^{-1}$ .

(מדוע?) ולכן גם  $y^{-1} \in \text{conj}(x)$ . ושוב יש מספר זוגי של איברים (וודאו ש- $y^{-1}$  אכן שונה מכל האיברים במחלקה). ממשיכים בתהליך דומה עד אשר "נגמרים" האיברים בחבורה, ואנחנו נשארים עם סתירה. ☺

מש"ל

### שאלה 3

רשמו את משוואת המחלקות עבור החבורות  $S_4, S_5, D_4$ .

למשל: משוואת המחלקות של  $D_6$  היא  $12 = 2 + 3 + 3 + 2 + 2$ .

### פתרון

עבור  $n \geq 3$   $Z(S_n)$  טריוויאלי. מחלקת צמידות נתונה ב  $S_n$  מורכבת מכל התמורות בעלות מבנה מחזורים זהה עבור איזשהו מבנה מחזורים.

משוואת המחלקות של  $S_4$  היא  $24 = 1 + 6 + 8 + 6 + 3$ . כאשר בכל אחת ממחלקות הצמידות  $\{(-)\}, \{(-)\}, \{(-)\}, \{(-)\}$  שישה איברים, במחלקת הצמידות  $\{(-)\}$  שמונה איברים ובמחלקת הצמידות  $\{(-)\}$  שלושה איברים.

מהי משוואת המחלקות של  $S_5$ ? גודל מחלקת הצמידות  $\{(-)\}$  הוא  $\binom{5}{2} = 10$ .

גודל מחלקת הצמידות  $\{(-)\}$  הוא  $\binom{5}{3} 2! = 20$ . גודל מחלקת הצמידות

$\{(-)\}$  הוא  $\binom{5}{4} 3! = 30$ . גודל מחלקת הצמידות  $\{(-)\}$  הוא  $4! = 24$ .

גודל מחלקת הצמידות  $\{(-)\}$  הוא  $\frac{\binom{5}{2}\binom{3}{2}}{2} = 15$ . גודל מחלקת הצמידות

$\{(-)\}$  הוא  $\binom{5}{3} 2! = 20$ .

מכאן משוואת המחלקות של  $S_5$  היא  $120 = 1 + 10 + 20 + 30 + 24 + 15 + 20$ .

מהי משוואת המחלקות של  $D_4$ ?

הוכחנו בתרגול את הטענה הבאה: עבור חבורת- $p$  לא אבלית  $G$  מסדר  $p^3$  מתקיים  $|Z(G)| = p$  וגם לכל  $a \notin Z(G)$  מתקיים  $|conj(a)| = p$ . מכאן כל מחלקת צמידות מגודל  $1 <$  היא מגודל  $p$  ומשוואת המחלקות של חבורה מסוג זה היא:

$$p^3 = \underbrace{p + p + \dots + p}_{p^2 \text{ times}}$$

בפרט אצלנו  $D_4$  לא אבלית מסדר  $8 = 2^3$  לכן משוואת המחלקות שלה היא:  $8 = 2 + 2 + 2 + 2$ .

מש"ל

#### שאלה 4

תנו דוגמאות לחבורה:

- א. פתירה ופשוטה;
- ב. פתירה ולא פשוטה;
- ג. לא פתירה ופשוטה;
- ד. לא פתירה ולא פשוטה.

#### פתרון

א.  $(\mathbb{Z}_p, +)$  עבור  $p$  ראשוני היא אבלית ולכן פתירה. כמו כן היא פשוטה היות ול- $\mathbb{Z}_p$  אין תת חבורות נורמליות לא טריוויאליות.

[שימו לב שזהו הפתרון היחיד. שכן, אם החבורה היא פשוטה אזי סדרת ההרכב שלה היא  $\{1\} \triangleleft G$ . בגלל הפתירות מקבלים שהחבורה אבלית. וחבורה אבלית (סופית, כמובן) היא פשוטה אמ"מ היא מסדר ראשוני.]

ב. למשל, כל חבורה מסדר  $pq$  (ראו את התרגיל הקודם), או למשל  $S_4$ , או כל  $D_n$ .

ג. עבור  $n \geq 5$   $A_n$ .

ד. עבור  $n \geq 5$   $S_n$ .

מש"ל

## שאלה 5

תהא  $G$  חבורה מסדר  $p^2q$  (עבור  $p, q$  ראשוניים) הוכיחו ש-  $G$  פתירה.

### פתרון

ראינו בתרגול שיש ל-  $G$  תת חבורה נורמלית שהיא או  $p$ -סילו או  $q$ -סילו. אם  $n_q = 1$  אזי תת החבורה  $Q$ -סילו היא מסדר  $q$ . במקרה זה נתבונן בסדרה הנורמלית:  $G \triangleright Q \triangleright \{e\}$ . אזי  $|G/Q| = p^2$  ולכן  $G/Q$  אבליית;  $Q/\{e\} \cong \mathbb{Z}_q$  אבליית; ולכן  $G$  פתירה.

אם  $n_p = 1$  אז תת החבורה  $P$ -סילו היא מסדר  $p^2$ . נתבונן בסדרה הנורמלית:  $G \triangleright P \triangleright \{e\}$ . אזי  $|G/P| = q$  ולכן  $G/P \cong \mathbb{Z}_q$  אבליית; וגם  $P/\{e\} \cong P$  ולכן  $P$  חבורה אבליית; לכן  $G$  פתירה.

מש"ל

## שאלה 6

**א.** תהא  $G$  חבורה מסדר 34. הוכיחו שהיא פתירה.

### פתרון

$34 = 2 \cdot 17$  ולכן  $G \cong \mathbb{Z}_{34}$  או  $G \cong D_{17}$  ובכל אחד מהמקרים הללו  $G$  פתירה.

**ב.** תהא  $G$  חבורה עם: 20,52 או 175 איברים. הוכיחו ש  $G$  לא פשוטה.

### פתרון

אלה הן חבורות מסדר  $p^2q$  והראינו בכיתה שחבורות אלה אינן פשוטות.

**ג.** הוכיחו או הפריכו: אין חבורה פשוטה מסדר 125.

### פתרון

$5^3 = 125$ . זוהי חבורת  $p$  ולכן המרכז שלה אינו טריוויאלי. אבל המרכז הוא תת-חבורה נורמלית ולכן יש תת-חבורה נורמלית לא טריוויאלית והחבורה אינה פשוטה.

שימו לב: יתכן והחבורה היא אבליית, ואז המרכז הוא אמנם תח"נ אך טריוויאלית. אך גם במקרה כזה החבורה אינה פשוטה, שכן, חבורה אבליית סופית היא פשוטה אמ"מ היא מסדר ראשוני.

**ד.** תהא  $G$  חבורה מסדר 1645 או 9797. הוכיחו ש  $G$  ציקלית.

## פתרון

### לגבי 9797:

101\*97=9797 ולכן אם  $G$  חבורה מסדר 9797 אז ע"פ המשפט על חבורות מסדר  $G, pq$  ציקלית.

### לגבי 1645:

$1645 = 5 \cdot 7 \cdot 47$ . ניתן לראות ש  $n_5 = n_7 = n_{47} = 1$ . שלוש תתי החבורות הללו הן ציקליות ונורמליות. נסמן:  $H_5 = \langle a \rangle, H_7 = \langle b \rangle, H_{47} = \langle c \rangle$ .

לכן, לפי טענה מהתרגול,  $G$  היא מכפלה ישרה של החבורות הללו. כלומר,  $G \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{47} \cong \mathbb{Z}_{1645}$ , ולכן ציקלית.

ה. הוכיחו או הפריכו: כל חבורה מסדר 15,16,17 היא אבלית.

## פתרון

17- ראשוני ולכן כל חבורה מסדר זה היא ציקלית, ולכן אבלית.

16 – לא נכון.  $D_8$  היא מסדר 16 אך היא לא אבלית.

15- מתקיים  $5 \neq 1 \pmod{3}$   $\wedge 15 = 3 \cdot 5$  ולכן החבורה ציקלית ולכן אבלית.

ו. הוכיחו שחבורה מסדר 42 אינה פשוטה.

## פתרון

קל לבדוק שמתקיים  $n_7 = 1$  ולכן יש חבורת 7-סילו נורמלית.

ז. הוכיחו שחבורה מסדר 130 אינה פשוטה, ומצאו חבורה לא אבלית מסדר זה.

## פתרון

קל לבדוק ש-  $n_{13} = 1$  ולכן יש חבורת 13-סילו נורמלית. מכאן החבורה

אינה פשוטה. דוגמה לחבורה לא אבלית, אינה פשוטה מסדר 130:

$$D_{13} \times \mathbb{Z}_5$$

מש"ל

## שאלה 7

א. הוכיחו: תהי  $K$  תת חבורת  $p$  סילו של  $G$ , ותהי  $H < G$ . אזי  $H \cap K$  היא

תת חבורת  $p$  סילו של  $H$ .

ב. תנו דוגמה נגדית במקרה ש-  $H$  אינה נורמלית.

## פתרון

**א.** ראשית הכוונה היתה ש  $|H| \mid p$ . אחרת אין כלל תת חבורת  $p$  סילו ל- $H$ .

סדרי כל האיברים, פרט ליחידה, ב-  $H \cap K$  הם חזקות של  $p$ , שכן סדר כל איבר ב-  $H \cap K$  מחלק את הסדר של  $K$ . לכן  $H \cap K$  חבורת  $p$ . נראה שכל חבורת  $p$  שהינה ת"ח של  $H$  מוכלת בצמוד של  $H \cap K$ . כלומר בחבורה מהצורה  $g(H \cap K)g^{-1} \cong H \cap K$  עבור איזשהו  $g \in G$ . מכאן נסיק שתת החבורה  $H \cap K$  היא תת חבורת  $p$  מקסימלית של  $H$  וש- $H \cap K$  היא תת חבורת  $p$ -סילו של  $H$ . לצורך זה תהי  $M$  תת חבורת  $p$  של  $H$  כלשהי. אזי היא בפרט תת חבורת  $p$  של  $G$ . כעת,  $K$  תת חבורת  $p$ -סילו של  $G$  ומכאן קיים  $g \in G$  כך ש  $M \subseteq gKg^{-1}$ . מצד שני  $H \triangleleft G$  ולכן  $M \subseteq H = gHg^{-1}$ . בסה"כ נקבל ש  $M \subseteq gHg^{-1} \cap gKg^{-1} = g(H \cap K)g^{-1}$  כדרוש.

**ב.** תהי  $K = \langle \tau \rangle$ ,  $G = D_3$  תת חבורת 2-סילו של  $G$  ותהי  $H = \langle \tau\sigma \rangle = \{id, \tau\sigma\}$ .

אזי  $H$  בעצמה תת חבורת 2-סילו של  $G$  אבל  $H \cap K$  היא טריוויאלית.

מש"ל

## שאלה 8

תהי  $N \triangleleft G$  ויהי  $f: G \rightarrow G/N$  ההומומורפיזם הטבעי. (הכל סופי). הוכיחו שהתמונה של כל תת חבורת  $p$ -סילו של  $G$ , היא תת חבורת  $p$ -סילו של  $G/N$  (שימו לב שהתמונה היא  $PN/N$ ).

## פתרון

ניתן להניח שמתקיים  $|G| = p^k r$ ,  $|N| = p^s t$  כאשר  $p \nmid |G|$ ,  $p \nmid |N|$  וכן

$t \mid r$  ו- $1 \leq s \leq k$ . כעת, תהי  $P$  ת"ח  $p$ -סילו של  $G$  אזי סדרה הוא  $p^k$ . מתקיים:

$$\left| \frac{G}{N} \right| = \frac{|G|}{|N|} = p^{k-s} \frac{r}{t} \text{ מ"ל ש- } \left| \frac{PN}{N} \right| = p^{k-s} \text{ . עפ"י משפט האיזומורפיזם השני}$$

$$\left| \frac{PN}{N} \right| = \left| \frac{P}{P \cap N} \right| = \frac{|P|}{|P \cap N|} = \frac{p^k}{|P \cap N|} \text{ . כעת, עפ"י שאלה קודמת ידוע ש-}$$

$P \cap N$  היא תת חבורת  $p$ -סילו של  $N$  ולכן  $|P \cap N| = p^s$  שכן  $|N| = p^s t$ . לכן,

$$\text{כדורש.} \quad \left| \frac{PN}{N} \right| = \left| \frac{P}{P \cap N} \right| = \frac{|P|}{|P \cap N|} = \frac{p^k}{p^s} = p^{k-s}$$

מש"ל

## שאלה 9

הוכיחו שכל חבורה מסדר 88 היא פתירה.

## פתרון

$88 = 2^3 \cdot 11$ .  $n_{11} \mid 8 \wedge n_{11} \equiv 1 \pmod{11}$  ולכן  $n_{11} = 1$ . מכאן קיימת תח"נ 11-סילו ל- $G$ ; נסמנה  $H$ . תת החבורה  $H$  היא ציקלית מסדר ראשוני ולכן אבלית ופתירה.  $G/H$  חבורת  $p$ , שכן סדרה הוא  $2^3$  ולכן היא פתירה. מכיון ש  $H$  ו- $G/H$  פתורות נקבל עפ"י משפט ש- $G$  פתירה.

מש"ל